



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 16 de març de 2012



Cultius:

Olivera , Avellaner , Ametller , Presseguer i nectarina i Horta

Olivera

Repilo o "Ull de gall"

Durant aquests mesos és el període crític per a les infeccions d'aquesta malaltia. A les zones on hi hagi presència important d'inòcul, taques a les fulles, i elevada humitat ambiental cal realitzar un tractament per a la protecció de fulles noves.

Cal recordar que mesures culturals com podes que afavoreixin la ventilació dels arbres o un adobat nitrogenat equilibrat contribueixen a disminuir la incidència d'aquesta malaltia.

Avellaner

Barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*)

Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l'hivern per fer una lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les galeries actives sobre les quals es pot actuar mitjançant filferros, molles o xeringues

Ametller

Floració: monilia

A les zones on es produeixen atacs de la malaltia, es recomana realitzar un tractament a l'inici de la floració.

Posfloració: pugó

A mesura que les varietats quedin lliures de les despulles florals o collarí, i es vegi l'ametlló com l'ungla, es recomana realitzar el seu control.

Presseguer i nectarina

Arrufat i cribat

A mesura que les varietats comencin a inflar els borrons, cal fer un tractament amb fungicides cúprics per evitar aquestes malalties

Pugó i poll de San Jose

A les plantacions on les varietats es trobin amb botó rosa, es poden iniciar els tractaments per protegir-les contra el pugó, i contra el poll de San Jose en aquelles finques afectades.

Horta

CARXOFERA

Cuc de la carxofa (*Gorthyna xanthenes*)

Cal seguir controlant les larves d'aquest barrinador, per tal d'evitar que penetrin a l'interior de les fulles, ja que, una vegada a dins, els tractaments no són eficaços.

PATATA

És recomanable utilitzar patata de sembra certificada i sembrar els tubercles sencers sense trossejar-los, per evitar problemes fitosanitaris posteriors

ENCIAM, ESCAROLA, COL I COL-I-FLOR

Pugó i Erugues

Es recomana vigilar les plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes.

CEBA

Míldiu

Per tal d'evitar la proliferació d'aquesta malaltia cal fer els tractaments oportuns.