



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avis del dia: 30 de març de 2012



Cultius:

Olivera , Avellaner , Ametller , Presseguer i nectarina i Horta

Olivera

Repilo o "Ull de gall"

Durant aquests mesos és el període crític per a les infeccions d'aquesta malaltia. Davant de les darreres pluges, a les zones on hi hagi presència important d'inòcul, taques a les fulles, i elevada humitat ambiental cal realitzar un tractament per a la protecció de fulles noves.

Cal recordar que mesures culturals com podes que afavoreixin la ventilació dels arbres o un adobat nitrogenat equilibrat contribueixen a disminuir la incidència d'aquesta malaltia.

Avellaner

Barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*)

Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l'hivern per fer una lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les galeries actives sobre les quals es pot actuar mitjançant filferros, molles o xeringues.

Badoc

Només en aquelles finques amb una afectació molt important, es pot realitzar un tractament a l'estadi 3-6 fulles.

Ametller

Floració: monilia

A les zones on es produeixen atacs de la malaltia, es recomana realitzar un tractament a l'inici de la floració.

Posfloració: pugó

A mesura que les varietats quedin lliures de les despulles florals o collarí, i es vegi l'ametlló com l'ungla, es recomana realitzar el seu control.

Presseguer i nectarina

Prefloració: **pugó, arrufat i cribat**

A les plantacions on les varietats es trobin en botó rosa, es poden iniciar els tractaments per protegir-les contra pugó.

Les actuals condicions climàtiques són favorables per la propagació de malalties, afegiu un fungicida orgànic contra arrufat i cribat

Floració: **monila**

Les darreres pluges i temperatura són molt favorables aquesta malaltia, en les zones afectades cal extremar la vigilància i protegir els arbres que estiguin en floració .

Horta

PATATA

És recomanable utilitzar patata de sembra certificada i sembrar els tubercles sencers sense trossejar-los, per evitar problemes fitosanitaris posteriors

ENCIAM, ESCAROLA, COL I COL-I-FLOR

Pugó i Erugues

Es recomana vigilar les plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes.

CEBA

Míldiu i *Stemphylium*

Per tal d'evitar la proliferació d'aquesta malaltia cal fer els tractaments oportuns.

TOMÀQUET

Tuta absoluta

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte.