



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avis del dia: 05 d' abril de 2012



Cultius:

Olivera , Vinya , Noguer , Avellaner , Ametller , Presseguer i nectarina i

Horta

Vinya

Corc del raïm

A les finques on es realitzi la confusió sexual, a partir de la setmana vinent ja es podran penjar els difusors.

Olivera

Repilo o "Ull de gall"

Durant aquests mesos és el període crític per a les infeccions d'aquesta malaltia. Davant de les darreres pluges, a les zones on hi hagi presència important d'inòcul, taques a les fulles, i elevada humitat ambiental cal realitzar un tractament per a la protecció de fulles noves.

Cal recordar que mesures culturals com podes que afavoreixin la ventilació dels arbres o un adobat nitrogenat equilibrat contribueixen a disminuir la incidència d'aquesta malaltia.

Noguer

Bacteriosi

Els tractaments preventius amb productes cúprics són essencials per controlar aquesta malaltia. El primer tractament contra bacteriosi s'ha de fer a l'inici de la brostada.

Avellaner

Badoc

Només a les finques on hi hagi més d'un 15% de borrons afectats per badoc, es recomana realitzar un tractament a l'estadi de 3-6 fulles.

Ametller

Post-floració: pugó

A mesura que les varietats quedin lliures de les despulles florals o collarí, i es vegi l'ametlló com l'ungla, es recomana realitzar el seu control.

Presseguer i nectarina

Floració: Monila

Les darreres pluges i temperatura són molt favorables per la propagació d'aquesta malaltia, en les zones afectades cal extremar la vigilància i protegir els arbres que estiguin en floració .

Post-floració: Trips

Només caldrà tractar el trips a caiguda de pètals, si es preveu atac fort, i en varietats sensibles.

Horta

PATATA

És recomanable utilitzar patata de sembra certificada i sembrar els tubercles sencers sense trossejar-los, per evitar problemes fitosanitaris posteriors

ENCIAM, ESCAROLA, COL I COL-I-FLOR

Erugues

Es recomana vigilar les plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes.

CEBA

Míldiu

Per tal d'evitar la proliferació d'aquesta malaltia cal fer els tractaments oportuns.

TOMÀQUET

Tuta absoluta

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte.