



## Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

**Avís del dia:** 11 de maig de 2012



**Cultius:**

**Vinya, Noguer, Avellaner, Ametller, presseguer i nectarina i Horta**

### Vinya

#### **Cendrosa**

Recordem la importància del tractaments preventius, el primer dels quals s'ha de realitzar quan la brotada té uns 10-12 cm de longitud.

#### **Mildiu**

A partir d'ara ja està en funcionament la xarxa contra el mildiu.

Recordem que es premiarà la localització de la primera i segona taca de cada comarca.

#### **Altica, Blaveta o Saltiró**

En aquelles finques on en els darrers anys hi ha hagut problemes d'aquesta plaga, cal extremar la vigilància en el període de brotada i avisar al tècnic de l'ADV en el cas de la DO. Montsant.

### Noguer

#### **Carpocapsa**

Ja s'ha iniciat el vol de la primera generació. Esteu atents al contestador.

#### **Bacteriosi**

Els tractaments preventius amb productes cúprics són essencials per controlar aquesta malaltia: Recordem que el segon tractament es realitza a l'inci de la floració femenina i el tercer tractament a quallat del fruit

#### **Antracnosi**

Recordeu que ja es va donar l'avís del primer tractament a l'inici de la floració femenina. Cal realitzar el segon tractament al quallat del fruit i el tercer 15 dies més tard amb fungicides orgànics.

### Avellaner

#### **Pugó**

Cal anar observant el revers de les fulles, i si es detecten colònies de pugó tracteu si és necessari.

#### **Barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*)**

En cas d'utilitzar la tècnica de la confusió sexual contra el barrinador de la fusta, ja es poden col·locar els difusors.

## Ametller

### **Brot sec o fusicocum**

Especialment en la zona litoral i en les finques amb problemes d'aquesta malaltia, recordem la necessitat de protegir els arbres quan es produeixen pluges i altes humitats, tal com s'estan produint els darrers dies.

### **Pugó**

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les plantacions.

## Presseguer i nectarina

### **Post-floració:**

#### **Cendrosa**

A les varietats molt sensibles, cal iniciar la protecció del fruit a partir d'un centímetre de diàmetre, i fins a l'enduriment del pinyol.

### **Pugó**

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les plantacions

## Horta

### **ENCIAM i CARXOFA**

#### **Pugó**

Cal vigilar les plantacions i quan s'observin els primers atacs, tracteu per tal d'evitar la seva proliferació.

### **CEBA i PATATA**

#### **Míldiu**

Les humitats persistents i l'augment de temperatures diürnes afavoreixen l'aparició d'aquesta malaltia, vigileu les plantacions i protegiu en cas de ser necessari.

### **TOMÀQUET**

#### ***Tuta absoluta***

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte.

### **PATATA**

#### **Escarabat de la patata**

Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult) d'aquesta plaga s'ha de realitzar el tractament.

## Altres

**Atenció a la nova plaga de *Drosophila Suzukii*** que pot afectar a **maduixes, cireres, prunes, albercocs, préssec i vinya.**

Cal estar atents i avisar a aquest servei si es detecten els primers símptomes, així com seguir les recomanacions d'aquest contestador en el que anirem informant sobre l'evolució de la plaga.