



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 12 d'agost de 2014
Avís 65/2014

Cultius:
Vinya, olivera, avellaner, fruiters i horta.

Vinya:

Cuc del Raïm: Tercera generació

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorrantrianiprol, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

- **Baix Penedès:** Ja vam donar l'avís
- **Camp de Tarragona:**
 - **A la zona primerenca, a les zones mitjanes i a les zones tardanes**, ja vam donar l'avís.
 - **A les zones més tardanes** com parts altes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S^a Maria, Les Destres, Les Pobles i les Planes de Cabra la màxima eclosió és dilluns 11, dimarts 12 i dimecres 13.
- **Priorat DO Montsant:**
 - **A les zones primerenques i a les zones mitjanes**, ja vam donar l'avís.
 - **A les zones tardanes** de Cabacés, La Figuera, Margalef i La Bisbal, la màxima eclosió és diumenge 10, dilluns 11 i dimarts 12.
 - **A la zona més tardana** de Cornudella i Ulldemolins, l'inici de l'eclosió és dilluns 11 i dimarts 12.
- **DOQ Priorat**
 - **A les zones primerenques i a la zona mitjana** ja vam donar l'avís.
 - **A la zona tardana** com Porrera, Poboleda, Scala Dei, la Morera i el terme de Falset limítrof amb Porrera la màxima eclosió és dimecres 13, dijous 14, divendres 15 i dissabte 16.
- **Conca de Barberà:**
 - **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà, estem en període de posta.
 - **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga estem en període de posta.
 - **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort s'ha iniciat el vol.

Míldiu:

Estem detectant en moltes finques nombroses taques a les puntes dels sarments. En aquests casos, si la incidència és molt elevada i es vol tractar, cal fer-ho cobrint molt bé tota la vegetació.

Avís sobre l'aplicació de productes fungicides

Recordem que com a mesura necessària per a evitar possibles alteracions en la fermentació, dins dels 21 dies abans de la verema no s'aconsella fer tractaments amb productes fungicides.

Olivera:

Mosca de l'oliva. *Bactrocera oleae*

A les zones interiors del Baix Penedès i al Priorat, s'ha de fer un tractament de dilluns 11 fins divendres 15.

Al Baix Camp i a les comarques de l'Alt Camp i Conca de Barberà cal estar atents al contestador.

Malgrat tot, donat que els atacs de mosca són molt irregulars, per part dels pagesos cal seguir fent recomptes de picada per completar la nostra informació i tractar si es supera l'índex del 5% d'olives picades.

Recordem que en agricultura ecològica cal mantenir protegit el cultiu amb Spintor cebo, caolí o *Beauveria bassiana*. S'ha de tenir en compte que per al caolí cal cobrir molt bé el fruit realitzant dues passades per banda, una en cada direcció.

Avellaner :

Zeuzera pyrina

En general les poblacions al camp de Tarragona es mantenen baixes. Solament a les finques amb molta presència de plaga i que no es realitzi la confusió sexual, s'aconsella fer el segon tractament des de dijous dia 7 fins dimarts 12.

Fruiters

Mosca de la fruita o *Ceratitis*

Les poblacions són molt elevades, cal estar molt atents i anar protegint els fruits.

Horta:

Tomàquet

Tuta absoluta

Generalment a l'agost augmenten les poblacions, cal estar atents i protegir el cultiu. Amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb els insectes depredadors. Recordem que per tal d'evitar l'aparició de resistències és molt important seguir les especificacions que posa l'etiqueta dels productes, incloent el número màxim d'aplicacions per campanya.

Cuc del tomàquet o *Heliothis*

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant, els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

Amb baixa humitat relativa i calor apareix aquest àcar. Cal localitzar les primeres taques de color bronzejat a la part baixa i tractar localment. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris:](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda de Catalunya, 50. 43002 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

ssv.t.daam@gencat.cat

[@eatarragonacat](#)