



## Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

**Avís del dia:** 20 de febrer de 2015  
**Avís 05/2015**

**Cultius:**

**Vinya, avellaner i noguer, ametller, presseguer i nectarina, horta i parcs i jardins.**

Els dies 11 i 12 de març es celebra el **Congrés Smartfruit** a Barcelona, a on es parlarà sobre la Gestió Integrada de Plagues en els cultius de Vinya, Olivera, Fruita Seca, Horta i Fruïters. Podeu trobar més informació a: <http://smartfruitcongress.cat>

### Vinya

#### Malalties de fusta

Les ferides produïdes durant la poda de la vinya són els llocs per on penetren els fongs que posteriorment causaran les malalties de la fusta. Com que actualment no hi han mètodes ni productes curatius, són d'especial importància les següents mesures preventives:

- Podar aviat les vinyes més afectades
- Eliminar i destruir els braços i els ceps morts
- Fer una poda racional, minimitzant en la mesura del possible la realització de ferides grosses.
- Evitar fer la poda en períodes plujosos o amb altes humitats.
- Aplicar algun protector sobre les ferides de poda.

### Avellaner i noguer

#### Barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*)

Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l'hivern per fer una lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les galeries actives sobre les quals es pot actuar mitjançant filferros o molles.

### Ametller

#### Varietats en prefloració: Arrufat i cribat

A les finques on durant la campanya anterior s'hagi produït una forta afectació d'arrufat o cribat cal realitzar la protecció des de l'estadi B (borró inflat) fins a caiguda de pètals.

#### Varietats en inici de floració: Monilia

A les finques on tradicionalment es produeixen atacs de la malaltia, es recomana realitzar un tractament a inici de floració.

## Presseguer i nectarina

### Varietats en prefloració

#### Arrufat i cribat

A les finques on durant la campanya anterior s'hagi produït una forta afectació d'arrufat o cribat cal realitzar la protecció des de l'estadi B (borró inflat) fins a caiguda de pètals.

#### Pugó i Poll San Jose

En les varietats primerenques que ja es trobin en botó rosa, es pot iniciar la protecció contra el pugó. En les finques afectades per poll de San Jose, també és el moment de fer el control.

*Nota: Cal assegurar-se que els productes utilitzats estan autoritzats en prefloració, ja que cal recordar que s'han produït modificacions en les autoritzacions d'algunes matèries actives.*

## Horta:

### Patata

És recomana utilitzar patata de sembra certificada i sembrar els tubercles sencers sense trossejar-los, per evitar problemes fitosanitaris posteriors

### Carxofa

#### Cuc de la carxofa (*Gorthina xanthenes*)

Continua l'eclosió dels ous, per tant, cal seguir controlant la població d'aquestes erugues abans de que penetrin als nervis de les fulles o a les tiges.

## Parcs i jardins:

### Palmeres

#### Morrut

Recordeu que durant els mesos de fred (desembre, gener i febrer) és el moment de realitzar la poda de les palmeres.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona  
Podeu trobar més informació al web del Departament: [www.gencat.cat/agricultura/sanitat](http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat)

#### Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris](#)

### Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>  
[ssv.t.daam@gencat.cat](mailto:ssv.t.daam@gencat.cat)



[@eatarragonacat](#)