



## Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

**Avís del dia:** 11 de desembre de 2015  
**Avís 80/2015**

**Cultius:**  
**Fruita seca i fruiters, vinya, horta, parcs i jardins i forestals**

### Fruita seca i fruiters:

#### Tractament a caiguda de fulla

Per protegir les ferides de la base dels pecíols i evitar l'entrada de fongs i bacteris causants de malalties, es recomana realitzar un tractament a caiguda de fulla amb compostos cúprics.

### Vinya:

#### Malalties de fusta

Les ferides produïdes durant la poda de la vinya, són els llocs per on penetren els fongs que posteriorment causaran les malalties de la fusta. Com que actualment no hi han mètodes ni productes curatius, són d'especial importància les següents mesures preventives:

- Podar aviat les vinyes més afectades i desinfectar les estisores utilitzades
- Eliminar i destruir els braços i els ceps morts
- Fer una poda racional, minimitzant en la mesura del possible la realització de ferides grosses.
- Evitar períodes plujosos o humits per realitzar la poda
- Aplicar algun protector o màstic sobre les ferides de poda

### Horta:

#### General

#### Erugues

Vigileu les vostres plantacions.

#### Ceba, i Calçot

#### Mildiu i stemphiliium

Recordeu que les humitats elevades i persistents afavoreixen aquestes malalties. Vigileu les plantacions per tal de realitzar-ne el control.

## Carxofa

### Taca negra (*Ascochyta hortorum*)

S'estan trobant fruits afectats a les plantacions. Recordeu la taca negra va associada a altes humitats, per tant és molt important intentar evitar-les.

### Cuc de la carxofa (*Gorthyna xanthenes*)

A partir de meitats de desembre s'acostuma a iniciar l'eclosió dels ous. Cal estar atents per tal de realitzar el tractament abans que les erugues penetrin a l'interior de les fulles, en aquest moment la larva és petita i vulnerable a més d'estar exposada a l'exterior.

## Parcs i jardins:

### Palmeres

#### Morrut

La poda de fulles verdes i les neteges o altres activitats que puguin causar ferides a la part viva, es farà prioritàriament entre els mesos de desembre i febrer, especialment amb les palmeres del gènere Phoenix.

Després de fer la poda és recomanable la protecció de les ferides i realitzar el tractament preventiu contra el morrut.

## Forestals:

### Pi

#### Processionària del pi

En el cas de detectar la presència de la plaga cal fer el tractament el més ràpid possible. A mesura que les erugues siguin més grans i les bosses més visibles, els danys s'incrementaran i l'eficàcia dels tractament anirà disminuint. Com a precaució, cal evitar el contacte amb les erugues per l'acció dels seus pèls urticants.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona

Podeu trobar més informació al web del Departament: [www.gencat.cat/agricultura/sanitat](http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat)

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris](#)

**Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)**

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

[ssv.t.daam@gencat.cat](mailto:ssv.t.daam@gencat.cat)