



## Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

**Avís del dia:** 15 de gener de 2016  
**Avís 2/2016**

**Cultius:**

**Vinya, ametller, avellaner i noguer, horta, parcs i jardins i forestals**

### Vinya

#### Malalties de fusta

Durant la poda, les ferides produïdes a la vinya, són els llocs per on penetren els fongs que causaran posteriorment les malalties de la fusta. Com que actualment no hi ha mètodes ni productes curatius, són d'especial importància les següents mesures preventives:

- De manera general, cal realitzar la poda aviat
- Deixar pel final la poda dels ceps que estan afectats o se sospita que poden estar-ho i desinfectar l'eina utilitzada
- Fer una poda racional, minimitzant al màxim la realització de ferides grosses.
- Eliminar i destruir els braços i els ceps morts
- Evitar realitzar la poda en períodes plujosos o força humits.
- Aplicar algun protector sobre les ferides de poda, especialment si son grans.

### Ametller

#### Arrufat i cribat

A les finques on durant la campanya anterior s'hagi produït una forta afectació d'arrufat o cribat cal realitzar la protecció des de l'estadi B (borró inflat) fins a caiguda de pètals.

Esteu atents a l'evolució fenològica de les diferents varietats, s'està avançant respecte a anys anteriors degut a les condicions climatològiques actuals.

### Avellaner i noguer

#### Barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*)

Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l'hivern per fer una lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les galeries actives dins les quals es pot actuar mitjançant filferros o molles.

## Horta:

### General

#### Erugues

Vigileu les vostres plantacions

### Ceba, i Calçot

#### Mildiu i stemphiliium

Recordeu que les humitats elevades i persistents afavoreixen aquestes malalties. Vigileu les plantacions per tal de realitzar-ne el control.

### Carxofa

#### Cuc de la carxofa (*Gorthina xanthenes*)

Durant aquesta època s'inicia l'eclosió dels ous. Cal estar atents i realitzar el tractament abans que les erugues penetrin a l'interior de les fulles.

#### Taca negra (*Ascochyta hortorum*)

S'estan trobant fruits afectats a les plantacions. Recordeu que la taca negra va associada a altes humitats, per tant és molt important intentar evitar-les.

## Parcs i jardins:

### Palmeres

#### Morrut

Recordeu que durant els mesos de fred (desembre, gener i febrer) és el moment de realitzar la poda de les palmeres.

## Forestals:

### Pi

#### Processionària del pi

Recordeu que el tractament ja s'hauria d'haver realitzat durant el mes d'octubre i novembre. A mesura que les erugues són més grans i les bosses més visibles, l'eficàcia dels tractaments disminueix. Com a precaució, cal evitar el contacte amb les erugues per l'acció dels seus pèls urticants.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona

Podeu trobar més informació al web del Departament: [www.gencat.cat/agricultura/sanitat](http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat)

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

[ssv.t.daam@gencat.cat](mailto:ssv.t.daam@gencat.cat)