



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural  
Serveis Territorials de Tarragona  
Sanitat Vegetal



## Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 26 d'abril de 2013



**Cultius:**  
**Olivera, Vinya, Noguer, Presseguer i nectarina, Avellaner, Horta i Forestals, Parcs i jardins**

### Olivera

#### Repilo o "Ull de gall"

Durant aquests mesos és el període crític per a les infeccions d'aquesta malaltia. Davant de les darreres pluges, a les zones on hi hagi presència important d'inòcul, com taques a les fulles, i amb elevada humitat ambiental cal protegir la nova brotada des de l'inici.

Cal recordar que mesures culturals com podes que afavoreixin la ventilació dels arbres o un adobat nitrogenat equilibrat contribueixen a disminuir la incidència d'aquesta malaltia.

### Vinya

#### Corc del raïm

A les finques on es realitzi la confusió sexual, ja es poden penjar els difusors.

#### Cendrosa

Recordem la importància dels tractaments preventius. El primer d'ells s'ha de fer a l'inici de la brotada, quan aquesta arribi als 10-12 cm de longitud.

### Noguer

#### Carpocapsa

Ja s'han iniciat les primeres captures d'adults. A les finques on es realitzi la confusió sexual ja s'han d'instal·lar els difusors.

#### Bacteriosi

Els tractaments preventius amb productes cúprics són essencials per controlar aquesta malaltia:

**Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona**

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

- El primer tractament contra bacteriosi s'ha de fer a l'obertura de borrons.
- El segon tractament es realitza a l'inci de la floració femenina.

#### **Antracnosi**

Recordeu que per controlar aquesta malaltia cal iniciar la protecció a l'inici de la floració femenina amb fungicides orgànics.

## **Presseguer i nectarina**

#### **Post-floració: Trips**

Només caldrà tractar el trips a caiguda de pètals, si es preveu atac fort, i en varietats sensibles.

#### **Cendrosa**

Cal protegir el fruit des de caiguda de collarí fins enduriment de pinyol.

#### **Monilia**

Les pluges d'aquesta setmana i l'augment de temperatura són molt favorables per la propagació d'aquesta malaltia, cal extremar la vigilància a les finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

## **Avellaner**

#### **Pugó**

Cal anar observant el revers de les fulles, i en cas de detectar presència de colònies de pugó groc, tracteu si és necessari. Si el tractament es retarda quan hi ha una forta presència de pugó, disminueix l'eficàcia dels tractaments i afecta més a la fauna útil.

## **Horta**

#### **CEBA, Míldiu i *Stemphylium***

#### **I PATATA, Míldiu**

Recordeu que en condicions de pluja i humitat i temperatures suaus s'afavoreix l'aparició d'aquestes malalties, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

#### **ALL I FAVERA**

#### **Rovell**

Vigileu les plantacions i en cas necessari tracteu.

#### **ENCIAM, COL I COL-I-FLOR: pugó i orugues**

Vigileu les plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes.

## **TOMÀQUET**

### **Tuta absoluta**

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte. Recordeu que tomaquera petita pot causar danys a l'ull de la planta aturant-ne el creixement.

## **PATATA**

### **Escarabat de la patata**

Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult) d'aquesta plaga s'ha de realitzar el tractament.

## **Altres**

### ***Drosophila Suzukii***

En els cultius de cirerer, cal estar atents i avisar a aquest servei si es detecten els primers símptomes. De moment les captures en els punts de control es mantenen baixes però cal estar atents ja que si les condicions són favorables (pluges, humitat relativa i temperatures suaus al voltant dels 20°C) en pocs dies les poblacions poden augmentar ràpidament.

## **Forestals, parcs i jardins**

### **PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)**

Entre l'inici de primavera i final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut en funció del tipus d'insecticida utilitzat i de les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta.

Els tractaments a tercers, han de ser efectuats per empreses o entitats que han d'estar inscrites oficialment al Registre Oficial de Productors i Operadors de mitjans de defensa fitosanitària. (Antigament ROESP).

Els tractaments fitosanitaris realitzats per particulars en els seus propis jardins, i que no disposin del carnet d'aplicador de productes fitosanitaris, solament podran ser realitzats amb productes fitosanitaris autoritzats en Jardineria Exterior Domèstica.

Les palmeres mortes per la plaga i les que es considerin que no es poden salvar, així com les restes afectades provinents de sanejaments, cal destruir-les i portar-les als punts establerts per tal de gestionar-les adequadament.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: [www.gencat.cat/agricultura](http://www.gencat.cat/agricultura)