



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 24 d'abril de 2015
Avís 13/2015

Cultius:

Olivera, vinya, avellaner, ametller, noguer, presseguer i nectarina, horta i parcs i jardins

Aquests dies s'han produït mullenes matinals. Cal estar atents a les malalties fúngiques dels diferents cultius.

Olivera

Repilo "ull de gall":

Es recorda que on hi hagi presència important d'inòcul, com taques a les fulles, i amb elevada humitat ambiental cal mantenir protegida la nova brotada, sobretot a les zones tardanes.

Mesures culturals com podes que afavoreixin la ventilació dels arbres, o un adobat nitrogenat equilibrat, contribueixen a disminuir la incidència d'aquesta malaltia.

Vinya

Corc del raïm. Confusió sexual

Els difusors de les feromones per a confusió sexual ja han d'estar col·locats a les vinyes.

Cendrosa

Recordem la importància dels tractaments preventius. El primer s'ha de fer a l'inici de la brotada, quan aquesta arribi als 10-12 cm. de longitud.

Avellaner

Pugó

Observeu el revers de les fulles per detectar les primeres colònies de pugó i tracteu només en cas necessari.

Ametller

Arrufat i cribat

Especialment en les zones on es produeixen humitats i s'observen símptomes cal mantenir els arbres protegits.

Pugó

A partir d'ara vigileu la presència de les primeres colònies de pugons en els brots tendres.

Noguer:

Bacteriosis

Els tractaments preventius amb productes cúprics són bàsics pel control d'aquesta malaltia, i especialment en períodes de pluges:

- El primer s'ha de fer a obertura de borrons
- El segon tractament es realitza a l'inici de la floració femenina.

Antracnosi

Per controlar aquesta malaltia cal iniciar la protecció a l'inici de la floració femenina amb fungicides orgànics.

Presseguer i nectarina

Pugó:

Cal vigilar si s'observen colònies de pugó a les brostades.

Arrufat i cribat:

Especialment si s'observen símptomes cal mantenir els arbres protegits.

Cendrosa:

Recordem que cal protegir el fruit, especialment les varietats sensibles, des de caiguda de collarí fins l'enduriment de pinyol.

Horta:

Horta en general

Pugó

S'està trobant pugó en diferents cultius. Vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus.

Tomàquet

Tuta absoluta

Ja s'han detectat les primeres captures a l'aire lliure, cal estar atents. Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis* respectuós amb la fauna auxiliar.

All i fava

Rovell

Vigileu les plantacions i en cas necessari tracteu.

Ceba, Enciam i Patata: Míldiu

Humitats altes i temperatures suaus afavoreixen l'aparició aquesta malaltia, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

Col, coliflor i bròquil

Erugues

Esteu atents a l'aparició de les erugues.

Parcs i jardins:

Palmeres

Morrut

S'ha detectat el vol dels primers adults. A partir d'aquest moment no es pot podar. Per mantenir protegides les palmeres es recomana realitzar els tractaments segons el protocol que podeu trobar a la web del Departament.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona
Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>
ssv.t.daam@gencat.cat