



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 16 d'abril de 2014
Avís 15/2014

Cultius:

Vinya, olivera, ametller, noguer, avellaner, presseguer i nectarina, horta i Forestals, parcs i jardins.

Vinya:

Cuc del raïm:

Al Baix Penedès, al Camp de Tarragona, Priorat i Conca de Barberà ja es poden posar els difusors de confusió sexual contra aquesta plaga.

Cendrosa:

Recordem la importància dels tractaments preventius. El primer s'ha de fer a l'inici de la brotada, quan aquesta arribi als 10-12 cm. de longitud.

Olivera:

Repilo "ull de gall":

Durant aquests mesos és el període crític per a les infeccions d'aquesta malaltia. Es recorda que a les zones on hi hagi presència important d'inòcul, com taques a les fulles, i amb elevada humitat ambiental o si es donen períodes de pluja cal mantenir protegida la nova brotada.

Mesures culturals com podes que afavoreixin la ventilació dels arbres o un adobat nitrogenat equilibrat contribueixen a disminuir la incidència d'aquesta malaltia.

Ametller:

Pugó:

A partir d'ara vigileu la presència de les primeres colònies de pugons en els brots tendres.

Noguer:

Bacteriosi

Els tractaments preventius amb productes cúprics són bàsics pel control d'aquesta malaltia, i especialment en períodes de pluges:

- El primer tractament s'ha de fer a obertura de borrons
- El segon tractament es realitza a l'inici de la floració femenina.

Avellaner :

Pugó

Observeu el revers de les fulles per detectar les primeres colònies de pugó i tracteu només en cas necessari.

Presseguer i nectarina:

Cendrosa:

Recordem que cal protegir el fruit, especialment les varietats sensibles, des de caiguda de collarí fins enduriment de pinyol.

Monilia:

Protegiu les varietats tardanes que encara estiguin en floració.

Pugó:

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les brotades.

Horta:

Tomàquet

Tuta absoluta

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte.

Ceba: Míldiu i *Stemphilium* i Enciam i Patata: Míldiu

Les altes humitats i les temperatures suaus afavoreixen l'aparició d'aquestes malalties, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

All i fava

Rovell

Vigileu les plantacions i en cas necessari tracteu.

Enciam

Pugó

Vigileu les vostres plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes.

Col, coliflor i bròquil

Erugues

S'estan observant danys per erugues, cal estar atents per protegir les plantacions.

Forestals, parcs i jardins

Palmeres

Morrut

Des de primavera i fins a final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut. Cal seguir les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta en funció del tipus d'insecticida utilitzat.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris:](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda de Catalunya, 50. 43002 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45 ssv.t.daam@gencat.cat

<http://www.gencat.cat/daam>