




Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Serveis Territorials de Tarragona
Sanitat Vegetal



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avis del dia: 12 d'abril de 2013



Cultius:

Vinya, Noguer, Presseguer i nectarina, Avellaner, Horta i Forestals, Parcs i jardins

Vinya

Corc del raïm

A les finques on es realitzi la confusió sexual, ja es poden penjar els difusors.

Cendrosa

Recordem la importància dels tractaments preventius. El primer d'ells s'ha de fer a l'inici de la brotada, quan aquesta arribi als 10-12 cm de longitud.

Noguer

Bacteriosi

Els tractaments preventius amb productes cúprics són essencials per controlar aquesta malaltia:

- El primer tractament contra bacteriosi s'ha de fer a l'obertura de borrons
- Esteu atents a la floració femenina de les varietats primerenques per realitzar el segon tractament

Presseguer i nectarina

Post-floració: Trips

Només caldrà tractar el trips a caiguda de pètals, si es preveu atac fort, i en varietats sensibles.

Cendrosa

Cal protegir el fruit des de caiguda de collarí fins enduriment de pinyol.

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

Poll blanc del presseguer:

Ja s'ha iniciat l'eclosió dels ous, les finques afectades esteu atents al contestador

Avellaner

Pugó

Cal anar observant el revers de les fulles, i en cas de detectar presència de colònies de pugó groc, tracteu si és necessari. Si el tractament es retarda, quan hi ha una forta presència de pugó, disminueix l'eficàcia dels tractaments i afecta més a la fauna útil.

Horta

CEBA

Míldiu i *Stemphylium*

Les condicions de pluja i humitat i temperatures suaus afavoreixen l'aparició d'aquestes malalties, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

ALL I FAVERA

Rovell

Vigileu les plantacions i en cas necessari tracteu.

ENCIAM, COL I COL-I-FLOR: pugó i orugues

Vigileu les plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes.

TOMÀQUET

Tuta absoluta

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte.

Forestals, parcs i jardins

PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Entre l'inici de primavera i final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut en funció del tipus d'insecticida utilitzat i de les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta.

Els tractaments a tercers, han de ser efectuats per empreses o entitats que han d'estar inscrites oficialment al Registre Oficial de Productors i Operadors de mitjans de defensa fitosanitària. (Antigament ROESP).

Els tractaments fitosanitaris realitzats per particulars en els seus propis jardins, i que no

disposin del carnet d'aplicador de productes fitosanitaris, solament podran ser realitzats amb productes fitosanitaris autoritzats en Jardineria Exterior Domèstica.

Les palmeres mortes per la plaga i les que es considerin que no es poden salvar, així com les restes afectades provinents de sanejaments, cal destruir-les i portar-les als punts establerts per tal de gestionar-les adequadament.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: www.gencat.cat/agricultura