



## Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 1 d'agost de 2012



Cultius:

Vinya, Olivera, Noguer, Avellaner, Fruïters, Presseguer i Horta

### Vinya

**Cuc del raïm: Tercera generació**

**Moments de tractament i productes:**

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, flufenoxuron, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

**-Baix Penedès:**

- **A la zona costanera** de Calafell i El Vendrell ja es va avisar.
- **A la zona interior** com l'Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i Banyeres la màxima eclosió és dimecres 1, dijous 2 i divendres 3 d'agost.

**-Camp de Tarragona:**

- **A la zona més primerenca** com la zona litoral de Constantí i Cambrils ja es va avisar.
- **A les zones mitjanes** de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Valls la màxima eclosió és dimecres 1, dijous 2 i divendres 3.
- **A les zones tardanes** com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S<sup>a</sup> Maria, Rodonyà, Masllorenç l'inici d'eclosió dels ous és dimecres 1 i dijous 2.

**-Priorat DO Montsant:**

- **A les zones primerenques** com Garcia, Darmós, zones baixes d'Els Guiamets i d'El Masroig ja es va donar l'avís.
- **A les zones mitjanes** com zones altes d'Els Guiamets, d'El Masroig, La Serra d'Almós, Capçanes, El Molar, Marçà, Falset, Pradell de la Teixeta i La Torre de Fontaubella la màxima eclosió es dijous 2, divendres 3 i dissabte 4.
- **A la zona tardana** de Cabacés, La Figuera, Margalef i La Bisbal, estem en període de posta dels ous.
- **A la zona més tardana** de Cornudella i Ulldemolins, s'ha iniciat la posta dels ous.

**-Priorat DOQ Priorat:**

- **A les zones primerenques** com Bellmunt, Lloar i El Molar l'inici d'eclosió és dilluns 30 i dimarts 31. La màxima eclosió és dijous 2, divendres 3 i dissabte 4.
- **A les zones mitjanes** com Gratallops, Vilella Alta i Baixa, Torroja i partides del terme de Porrera i Falset limítrof amb Gratallops estem en període de posta dels ous.
- **A la zona tardana** de Porrera, Poboleda, Escala Dei, la Morera i el terme de Falset limítrof amb Porrera s'ha iniciat el vol.

**-Conca de Barberà:**

- **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà s'ha iniciat la posta dels ous.
- **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga, s'ha iniciat el vol.
- **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort encara no

**Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona**

s'ha iniciat el vol.

### **Míldiu**

Cal estar atents per si apareixen taques en algun indret

### **Cendrosa**

En les varietats tardanes i sensibles a aquesta malaltia pot fer-se un quart tractament a l'inici del canvi de color.

### **Podridura grisa o Botrytis**

El tercer tractament es fa just a l'inici del verolat.

## **Olivera**

### **Mosca de l'olivera. *Bractocera oleae***

En els darrers controls que estem realitzant s'ha incrementat el nivell de picades.

Aconsellem fer un tractament en finques de la zona litoral del Baix Camp com Riudoms, Montroig, Cambrils etc, a la zona litoral del Baix Penedès com Vendrell, Calafell, Cunit i a la zona litoral del Tarragonès com Tarragona, La Riera de Gaià, el Catllar etc, des de dissabte dia 4 fins dijous dia 8.

A la resta de zones i comarques de l'Alt Camp, Priorat i Conca de Barberà caldrà estar molt atents.

Tot i això, donat que els atacs de mosca són molt irregulars, cal seguir fent recomptes de picada, i tractar quan es superi un índex de picada del 5%.

En agricultura ecològica, ja es va recomanar la protecció amb el caolí com a repel·lent i/o l'espinosad com adulticida.

## **Noguer**

### **Carpocapsa**

Ens trobem en segona generació. Vigileu la finca i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

## **Avellaner**

### **Zeuzera**

En general les poblacions al camp de Tarragona es mantenen baixes.

Solament a les finques amb molta presència de plaga i que no es realitzi la confusió sexual, s'aconsella fer el segon tractament des de dimecres dia 1 fins dilluns 6.

### **Aranya**

Vigileu la part interior dels avellaners que és per on s'observen els primers símptomes.

## **Fruiters:**

### **Mosca de la fruita: *Ceratits***

Aquest any les poblacions són molt elevades, cal estar atents des de l'inici del canvi de color per tal de protegir el període de maduració de les diferents varietats.

## Presseguer:

### Aranya

Recomanem vigilar les plantacions i tractar si es supera el llindar de tolerància, recordeu que aquest té en compte la presència de fauna auxiliar.

### Monilia

S'ha trobat algun fruit afectat, si les condicions són favorables es recomana protegir les varietats que estiguin a punt de collir.

## Horta

### TOMÀQUET

#### *Tuta absoluta*

En algunes finques s'ha vist un increment de les poblacions, per tant, és molt important realitzar controls individualitzats ja que els danys varien molt segons les condicions de cada parcel·la.

Amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb els enemics naturals que són molt importants per mantenir els nivells de tuta baixos.

Podeu consultar els productes autoritzats i les seves restriccions al full informatiu del DAAM i als avisos fitosanitaris que estan penjats a la web del departament. Recordeu que la utilització dels productes de forma inadequada afavoreix l'aparició de resistències.

#### Cuc del tomàquet o *Heliothis*

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

#### Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

En les condicions actuals de baixa humitat relativa i calor poden aparèixer atacs d'aquest àcar. Cal localitzar les primeres taques de color bronzejat a la part baixa i tractar localment. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

### MONGETA

#### Aranya

Estigueu atents i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació.

#### Erugues

S'estan trobant atacs d'erugues en mongeta, cal vigilar les plantacions.

## Altres

**Atenció a la nova plaga de *Drosophila Suzukii*** que pot afectar a **maduixes, cireres, prunes, albercocs, préssec i vinya.**

Cal estar atents i avisar a aquest servei si es detecten els primers símptomes, així com seguir les recomanacions d'aquest contestador en el que anirem informant sobre l'evolució de la plaga.

Recordem que de moment no s'han detectat danys a la demarcació i les captures en els punts de control es mantenen baixes.