




Generalitat de Catalunya  
Departament d'Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural  
Serveis Territorials de Tarragona  
Sanitat Vegetal



## Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 21 d'agost de 2013



**Cultius:**  
Vinya, Olivera, Avellaner, Fruïters, Presseguer i nectarina, Horta i Parcs i jardins

### Vinya

#### Cuc del raïm: Tercera generació

#### Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantropir, indoxacarb, metoxifenocid.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocid,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

**-Baix Penedès:** ja es va donar l'avís.

**-Camp de Tarragona:** ja es va donar l'avís.

#### **-Priorat DO Montsant:**

- **Solament queda la zona més tardana** de Cornudella i Ulldemolins, on l'inici de l'eclosió és dimarts 20 i dimecres 21. La màxima eclosió serà dissabte 24, diumenge 25 i dilluns 26.

#### **-Priorat DOQ Priorat:**

- **A les zones primerenques i a la zona mitjana** ja es va donar l'avís.
- **A la zona tardana** de Porrera, Poboleda, Escala Dei, la Morera i el terme de Falset limítrof amb Porrera la màxima eclosió és dimarts 20, dimecres 21 i dijous 22.

#### **-Conca de Barberà:**

- **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà la màxima eclosió serà divendres 23, dissabte 24 i diumenge 25.
- **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga estem en el període de la posta dels ous.
- **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort s'ha iniciat la posta dels ous.

#### **Cendrosa**

Estem detectant presència important d'aquesta malaltia, per tant cal extremar la vigilància i tractar si es detecten focus.

**Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona**

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

### **Nota**

En tots els casos, cal fer el tractament el millor possible passant per les dues cares.

## **Olivera**

### **Mosca de l'olivera. *Bactrocera oleae***

En els controls que estem fent ara, l'índex de picades es manté baix. Malgrat tot, tenint en compte la irregularitat del cultiu recomanem en les finques tradicionalment més afectades fer recompte de picades i tractar si es supera el llindar del 5%.

## **Avellaner**

### **Zeuzera**

En aquelles finques afectades i que no es realitzi la confusió sexual, es recomana fer el segon tractament del 19 fins el 23 d'agost.

## **Fruiters:**

### **Mosca de la fruita: *Ceratitis***

Aquest any les poblacions són molt elevades, cal protegir els fruits durant el període de maduració .

## **Presseguer i nectarina**

### **Grafolita**

Cal protegir els fruits des del verolat fins a la collita.

## **Horta**

### **TOMÀQUET**

#### ***Tuta absoluta***

Per a controlar aquesta plaga s'han d'integrar diferents mètodes entre els que hi ha la conservació dels enemics naturals, com són els insectes depredadors *Macrolophus* i *Nesidiocoris*, que ens seran de gran ajuda. És per això que amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb aquests individus.

#### **Cuc del tomàquet o *Heliothis***

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

#### **Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)**

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen els primers atacs d'aquest àcar. Cal localitzar les primeres taques de color bronzejat a la part baixa i tractar localment. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

### **Cul negre**

Amb l'augment de les temperatures pot aparèixer aquesta fisiopatia. Es recomana realitzar regs freqüents i poc abundants.

## **Parcs i jardins**

### **PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)**

Entre l'inici de primavera i final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut. Cal seguir les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta en funció del tipus d'insecticida utilitzat.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: [www.gencat.cat/agricultura](http://www.gencat.cat/agricultura)