



## Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

**Avís del dia:** 10 d'agost de 2012



**Cultius:**

**Vinya, Olivera, Noguer, Fruïters, Presseguer i Horta**

### Vinya

**Cuc del raïm: Tercera generació**

**Moments de tractament i productes:**

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, flufenoxuron, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis* (PAE\*), emamectina, spinosad (PAE\*), tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

**-Baix Penedès:** Ja es va avisar

**-Camp de Tarragona:**

- **A la zona més primerenca, mitjana i tardana** ja es va avisar.
- **A les zones més tardanes** com parts altes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S<sup>a</sup> Maria, Les Destres, Les Pobles i les Planes de Cabra la màxima eclosió dels ous serà dissabte 11, diumenge 12 i dilluns 13.

**-Priorat DO Montsant:**

- **A les zones primerenques, a les zones mitjanes i a la zona tardana** ja es va donar l'avis.
- **A la zona més tardana** de Cornudella i Ulldemolins, l'inici de l'eclosió dels ous és divendres 10 i dissabte 11.

**-Priorat DOQ Priorat:**

- **A les zones primerenques i a les zones mitjanes** ja es va avisar.
- **A la zona tardana** de Porrera, Poboleda, Escala Dei, la Morera i el terme de Falset limítrof amb Porrera la màxima eclosió és dissabte 11, diumenge 12 i dilluns 13.

**-Conca de Barberà:**

- **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà la màxima eclosió és dimecres 8, dijous 9 i divendres 10.
- **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga i de Sarral, la màxima eclosió és divendres 10, dissabte 11, diumenge 12 i dilluns 13.
- **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort l'inici d'eclosió és dilluns 13 i dimarts 14.

### **Avís sobre l'aplicació de productes fungicides**

Recordem que com a mesura necessària per a evitar possibles alteracions en la fermentació, dins dels 21 dies abans de la verema no es poden fer tractaments amb productes fungicides.

## Olivera

### **Mosca de l'olivera. *Bractocera oleae***

Recordeu que ja es va donar l'avís d'un primer tractament a la zona litoral del Baix Camp, zona litoral del Baix Penedès i a la zona litoral del Tarragonès.

A la resta de zones i comarques caldrà estar molt atents.

Tot i això, donat que els atacs de mosca són molt irregulars, cal seguir fent recomptes de picada, i tractar quan es superi un índex de picada del 5%.

En agricultura ecològica, recordem que ja es va recomanar la protecció amb el caolí com a repel·lent i/o l'spinosad com adulticida.

## Noguer

### **Carpocapsa**

Recordeu que cal continuar tenint el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

## Fruiters:

### **Mosca de la fruita: *Ceratits***

Aquest any les poblacions són molt elevades, cal estar atents des de l'inici del canvi de color per tal de protegir el període de maduració de les diferents varietats.

## Presseguer:

### **Aranya**

Recomanem vigilar les plantacions i tractar si es supera el llindar de tolerància, recordeu que aquest té en compte la presència de fauna auxiliar.

### **Monilia**

S'ha trobat algun fruit afectat, si les condicions són favorables es recomana protegir les varietats que estiguin a punt de collir.

## Horta

### **TOMÀQUET**

#### ***Tuta absoluta***

Cal realitzar controls individualitzats ja que les poblacions i els danys varien molt segons les condicions de cada parcel·la.

Amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis* (PAE\*), respectuós amb els enemics naturals que són molt importants per mantenir els nivells de tuta baixos.

Podeu consultar els productes autoritzats i les seves restriccions al full informatiu del DAAM i als avisos fitosanitaris que estan penjats a la web del departament. Recordeu que la utilització dels productes de forma inadequada afavoreix l'aparició de resistències.

#### **Cuc del tomàquet o *Heliothis***

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

### **Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)**

En les condicions actuals de baixa humitat relativa i calor poden aparèixer atacs d'aquest àcar. Cal localitzar les primeres taques de color bronzejat a la part baixa i tractar localment. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

## **Altres**

**Atenció a la nova plaga de *Drosophila Suzukii*** que pot afectar a **maduixes, cireres, prunes, albercocs, préssec i vinya.**

Cal estar atents i avisar a aquest servei si es detecten els primers símptomes, així com seguir les recomanacions d'aquest contestador en el que anirem informant sobre l'evolució de la plaga.

Recordem que de moment no s'han detectat danys a la demarcació i les captures en els punts de control es mantenen baixes.

\*PAE: Productes autoritzats en Producció Agrària Ecològica

**Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona**

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>