



Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Serveis Territorials de Tarragona
Sanitat Vegetal



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avis del dia: 8 de febrer de 2013



Cultius:

Ametller, presseguer i nectarina, avellaner i noguer, Vinya, Horta i Forestals, parcs i jardins

Ametller, presseguer i nectarina

Prefloració: arrufat i cribat

A les finques on durant la campanya s'hagi produït una forta afectació d'arrufat o cribat, cal realitzar un tractament cúpric a mesura que les varietats comencin a inflar els borrons (estadi B) i mantenir la protecció fins a caiguda de pètals si les condicions són favorables.

Floració: monilia

A les zones on es produeixen atacs de la malaltia, es recomana realitzar un tractament a l'inici de la floració

Avellaner i noguer

Barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*)

Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l'hivern per fer una lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les galeries actives sobre les quals es pot actuar mitjançant filferros, molles o xeringues.

Vinya

Malalties de fusta

Les ferides produïdes durant la poda de la vinya, són els llocs per on penetren els fongs que posteriorment causaran les malalties de la fusta. Com actualment no hi han mètodes ni productes curatius, són d'especial importància les següents mesures preventives:

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

- Podar aviat les vinyes més afectades
- Sempre que es pugui, cal evitar fer ferides grosses. En el cas de ser necessari fer-les, és convenient aplicar algun producte protector localitzat sobre les mateixes ferides.
- Evitar períodes d'humitats altes per realitzar la poda.
- Eliminar i cremar els braços i els ceps morts

Horta

CARXOFERA: Cuc de la carxofa (*Gorthyna xanthenes*)

A finals de desembre s'inicia l'eclosió dels ous. Cal estar atents per realitzar el tractament abans que les erugues penetrin a l'interior de les fulles.

Cendrosa

Les condicions climàtiques actuals es recomana realitzar un tractament.

ENCIAM, COL I COL-I-FLOR: Pugó

Vigileu les plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes.

ESCAROLA: Cendrosa API: Septoria

Cal estar atents a l'aparició de taques a les plantacions i realitzar els tractaments oportuns.

Forestals, parcs i jardins

PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Amb la baixada de temperatures hivernals, les captures d'insectes en les trampes de seguiment durant les últimes setmanes de desembre i gener, han estat nul·les.

Fins al més de febrer és el moment per realitzar treballs de poda i és una bona ocasió per vigilar si les palmeres estan afectades per la plaga.

Les palmeres mortes per la plaga i les que es considerin que no es poden salvar, així com les restes afectades provinents de sanejaments, cal destruir-les i portar-les als punts establerts per tal de gestionar-les adequadament.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: www.gencat.cat/agricultura