



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 16 de gener de 2015
Avís 02/2015

Cultius:

Vinya, avellaner i noguer, ametller, cítrics, horta i parcs i jardins.

Vinya

Malalties de fusta

Les ferides produïdes durant la poda de la vinya, són els llocs per on penetren els fongs que posteriorment causaran les malalties de la fusta. Com que actualment no hi han mètodes ni productes curatius, són d'especial importància les següents mesures preventives:

- Podar aviat les vinyes més afectades
- Eliminar i destruir els braços i els ceps morts
- Fer una poda racional, minimitzant en la mesura del possible la realització de ferides grosses.
- Evitar períodes plujosos o humits per realitzar la poda.
- Aplicar algun protector sobre les ferides de poda.

Avellaner i noguer

Barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*)

Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l'hivern per fer una lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les galeries actives sobre les quals es pot actuar mitjançant filferros o molles.

Ametller

Arrufat i cribat

A les finques amb varietats primerenques, on durant la campanya anterior s'hagi produït una forta afectació d'arrufat o cribat cal realitzar la protecció des de l'estadi B (borró inflat) fins a caiguda de pètals.

Cítrics:

Aigües dels fruits (*Phytophthora sp.*)

Si es produeixen pluges o humitats ambientals continues, es recomana protegir la fruita que queda per collir, amb especial atenció a les parts baixes dels arbres.

Horta:

Escarola: **Botritis i esclerotinia**; Calçot: **Botritis**; Col i coliflor: **bacteriosis**; Api: **Septoria**

Les pluges i humitats que s'estan donant, afavoreixen aquestes malalties. Vigileu les plantacions per tal de realitzar-ne el control.

Carxofa

Cuc de la carxofa (*Gorthina xanthenes*)

Durant aquesta època s'inicia l'eclosió dels ous. Cal estar atents i realitzar el tractament abans que les erugues penetrin a l'interior de les fulles.

Taca negra (*Ascochyta hortorum*)

Cal estar atents ja que s'han trobat fruits afectats. Recordeu la taca negra va associada a altes humitats, per tant és molt important intentar evitar-les realitzant un tractament.

Parcs i jardins:

Palmeres

Morrut

Recordeu que durant els mesos de fred (desembre, gener i febrer) és el moment de realitzar la poda de les palmeres.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona
Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda de Catalunya, 50. 43002 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

ssv.t.daam@gencat.cat



[@eatarragonacat](https://twitter.com/eatarragonacat)