



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avis del dia: 3 de juliol de 2012



Cultius:

Vinya, Olivera, Noguer, Avellaner, Fruïters i Horta

Vinya

Cuc del raïm: Segona generació.

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, flufenoxuron, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

-Baix Penedès i Priorat DO Montsant: En aquestes comarques ja es va avisar del tractament.

-Camp de Tarragona:

- **Solament resten les zones més tardanes** com parts altes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S^a Maria, Les Destres, Les Pobles i les Planes de Cabra, on el tractament de la màxima eclosió ha de fer-se dilluns 2, dimarts 3 i dimecres 4 de juliol.

-Priorat DOQ Priorat:

- **A les zones primerenques i mitjana** ja es va avisar.
- **A la zona tardana** de Porrera, Poboleda, Escala Dei, la Morera i el terme de Falset limítrof amb Porrera la màxima eclosió és diumenge 1, dilluns 2 i dimarts 3 de juliol.

-Conca de Barberà:

- **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà el tractament de la màxima eclosió és diumenge 1, dilluns 2 i dimarts 3 de juliol
- **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga el tractament de la màxima eclosió és dimecres 4, dijous 5 i divendres 6.
- **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort estem en el període de posta d'ous.

Míldiu

La pluja d'aquest passat diumenge va ser important a totes les comarques, entre 10 i 40 litres, per tant, aconsellem fer un tractament general entre dijous 5 i dissabte 7. Poden utilitzar-se productes de contacte a base de compostos cúprics i fungicides orgànics, mullant molt be tota la vegetació.

Cendrosa

En les varietats tardanes i sensibles a aquesta malaltia pot fer-se un quart tractament a l'inici del canvi de color.

Podridura grisa o Botrytis

El segon tractament s'ha de fer abans del tancament del raïm

Olivera

Prays o punxó

S'ha de tenir en compte que en la nostra zona i en la varietat arbequina l'olivera es veu poc afectada per aquesta plaga, amés la fauna auxiliar conjuntament amb les altes temperatures són capaces de fer un bon control.

No obstant, en aquelles finques que tradicionalment estiguin molt afectades per la plaga cal fer el tractament durant aquesta setmana, mullant molt bé la copa de l'arbre.

Noguer

Carpocapsa

Ja es poden trobar fruits atacats. Vigileu la finca i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

Avellaner

Zeuzera

Solament a les finques amb molta presència de plaga i que no es realitzi la confusió sexual, s'aconsella realitzar el primer dels 2 tractaments des de dimecres dia 27 fins dilluns 2.

Aranya

Vigileu la part interior dels avellaners que és per on s'observen els primers símptomes.

Diabló

Zones de muntanya més tardanes: A les finques afectades, ja es pot realitzar el segon tractament per protegir contra la picada de posta, des de dissabte 30 fins dimecres 4.

Zona del camp de Tarragona: Ja es va donar l'avís.

Fruiters:

Mosca de la fruita: Ceratits

Cal protegir les varietats a mesura que comenci el període de maduració.

Presseguer:

Aranya

Recomanem vigilar les plantacions i tractar si es supera el llindar de tolerància, recordeu que aquest té en compte la presència de fauna auxiliar.

Monilia

S'ha trobat algun fruit afectat, si les condicions són favorables es recomana protegir les varietats que estiguin a punt de collir.

Horta

TOMÀQUET

Tuta absoluta

Recordeu que és molt important utilitzar productes respectuosos amb els enemics naturals, per aquest motiu amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb aquests individus.

Cuc del tomàquet o Heliothis

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a Tuta absoluta ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

Míldiu del tomàquet (*Phytophthora infestans*)

Després de les darreres pluges i en condicions de temperatura i humitats altes, podria desenvolupar-se el fong, cal mantenir el cultiu protegit.

Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen els primers atacs d'aquest àcar. Cal localitzar les primeres taques amb la part baixa de color bronzejat i tractar localment. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

MONGETA

Aranya

Estigueu atents i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació.

Erugues

S'estan trobant atacs d'erugues en mongeta, cal vigilar les plantacions.

Altres

Atenció a la nova plaga de *Drosophila Suzukii* que pot afectar a **maduixes, cireres, prunes, albercocs, préssec i vinya.**

Cal estar atents i avisar a aquest servei si es detecten els primers símptomes, així com seguir les recomanacions d'aquest contestador en el que anirem informant sobre l'evolució de la plaga.

Recordem que de moment no s'han detectat danys a la demarcació i les captures en els punts de control es mantenen baixes.