




## Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

**Avis del dia:** 27 de juliol de 2012



**Cultius:**

**Vinya, Olivera, Noguer, Avellaner, Fruïters, Presseguer i Horta**

### Vinya

**Cuc del raïm: Tercera generació**

**Moments de tractament i productes:**

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, flufenoxuron, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

**-Baix Penedès:**

- **A la zona costanera** de Calafell i El Vendrell la màxima eclosió és dissabte 28, diumenge 29, dilluns 30 i dimarts 31.
- **A la zona interior** com l'Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i Banyeres l'inici d'eclosió és diumenge 29 i dilluns 30.

**-Camp de Tarragona:**

- **A la zona més primerenca** com la zona litoral de Constantí i Cambrils la màxima eclosió serà diumenge 29, dilluns 30 i dimarts 31.
- **A les zones mitjanes** de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Valls l'inici de l'eclosió és dissabte 28 i diumenge 29.
- **A les zones tardanes** com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S<sup>a</sup> Maria, Rodonyà, Masllorenç estem en el període de posta dels ous.

**-Priorat DO Montsant:**

- **A les zones primerenques** com Garcia, Darmós, zones baixes d'Els Guiamets i d'El Masroig, la màxima eclosió serà dijous 26, divendres 27 i dissabte 28.
- **A les zones mitjanes** com zones altes d'Els Guiamets, d'El Masroig, La Serra d'Almós, Capçanes, El Molar, Marçà, Falset, Pradell de la Teixeta i La Torre de Fontaubella l'inici de l'eclosió dels ous es diumenge 29 i dilluns 30.
- **A la zona tardana** de Cabacés, La Figuera, Margalef i La Bisbal, s'ha iniciat la posta dels ous.
- **A la zona més tardana** de Cornudella i Ulldemolins, s'ha iniciat el vol.

**-Priorat DOQ Priorat:**

- **A les zones primerenques** com Bellmunt, Lloar i El Molar estem en període de posta.
- **A les zones mitjanes** com Gratallops, Vilella Alta i Baixa, Torroja i partides del terme de Porrera i Falset limítrof amb Gratallops s'ha iniciat el vol.
- **A les zones tardanes** encara **no** s'ha iniciat el vol.

**-Conca de Barberà:** encara no s'ha iniciat el vol.

### **Míldiu**

Cal estar atents per si apareixen taques en algun indret

### **Cendrosa**

En les varietats tardanes i sensibles a aquesta malaltia pot fer-se un quart tractament a l'inici del canvi de color.

### **Podridura grisa o Botrytis**

El tercer tractament es fa just a l'inici del verolat.

## **Olivera**

### **Mosca de l'olivera. *Bractocera oleae***

Esta augmentant la picada de la primera generació, en la que normalment no cal realitzar tractaments de caràcter general en la varietat arbequina; però cal estar molt atents en les zones endèmiques. Malgrat tot s'està detectant en finques concretes d'algunes zones com Salomó, la Riera de Gaia, Cambrils... així com en varietats primerenques com sevillena, grossal, morruda etc. un índex de picada superior al 5%, per això cal fer un recompte de picades i realitzar un tractament si es supera el llindar. En agricultura ecològica, es pot iniciar la protecció amb el caolí com a repel·lent i/o l'espinosad com adulticida.

## **Noguer**

### **Carpocapsa**

Ens trobem en segona generació. Vigileu la finca i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

## **Avellaner**

### **Borró sec**

Ja s'ha donat l'avis.

### **Aranya**

Vigileu la part interior dels avellaners que és per on s'observen els primers símptomes.

## **Fruiters:**

### **Mosca de la fruita: *Ceratits***

Aquest any les poblacions són molt elevades, cal estar atents des de l'inici del canvi de color per tal de protegir el període de maduració de les diferents varietats.

## Presseguer:

### Aranya

Recomanem vigilar les plantacions i tractar si es supera el llindar de tolerància, recordeu que aquest té en compte la presència de fauna auxiliar.

### Monilia

S'ha trobat algun fruit afectat, si les condicions són favorables es recomana protegir les varietats que estiguin a punt de collir.

## Horta

### TOMÀQUET

#### *Tuta absoluta*

En algunes finques s'ha vist un increment de les poblacions, per tant, és molt important realitzar controls individualitzats ja que els danys varien molt segons les condicions de cada parcel·la.

Amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb els enemics naturals que són molt importants per mantenir els nivells de tuta baixos.

Podeu consultar els productes autoritzats i les seves restriccions al full informatiu del DAAM i als avisos fitosanitaris que estan penjats a la web del departament. Recordeu que la utilització dels productes de forma inadequada afavoreix l'aparició de resistències.

#### Cuc del tomàquet o *Heliothis*

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

#### Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

En les condicions actuals de baixa humitat relativa i calor poden aparèixer atacs d'aquest àcar. Cal localitzar les primeres taques de color bronzejat a la part baixa i tractar localment. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

### MONGETA

#### Aranya

Estiguedu atents i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació.

#### Erugues

S'estan trobant atacs d'erugues en mongeta, cal vigilar les plantacions.

## Altres

### Atenció a la nova plaga de *Drosophila Suzukii* que pot afectar a maduixes, cireres, prunes, albercocs, préssec i vinya.

Cal estar atents i avisar a aquest servei si es detecten els primers símptomes, així com seguir les recomanacions d'aquest contestador en el que anirem informant sobre l'evolució de la plaga.

Recordem que de moment no s'han detectat danys a la demarcació i les captures en els punts de control es mantenen baixes.