




Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Serveis Territorials de Tarragona
Sanitat Vegetal



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 23 de juliol 2013



Cultius:

Vinya, Olivera, Presseguer i nectarina, Horta i Parcs i jardins

Vinya

Míldiu

Les pluges que es van produir el dia 18, van afectar amb importància al Baix Penedès, Camp de Tarragona i Conca de Barberà, arribant a superar en alguns llocs els 50 litres. Recordem que en aquestes tres comarques, cal fer un tractament general quan es pugui entrar a les vinyes, preferiblement i si és possible entre el dilluns 22 i el dimecres 24. Es recomana utilitzar productes penetrants o bé sistèmics si en la parcel·la es troben taques o raïms afectats per la malaltia.

En viticultura ecològica cal seguir mantenint ben protegides les vinyes amb compostos cúprics.

Cuc del raïm: Segona i tercera generació

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

De la segona generació solament quedava per avisar les zones tardanes de la Conca de Barberà, com són les parts altes de l'Espuga i Sarral, Vimbodí i Rocafort, on el tractament de la màxima eclosió dels ous s'ha de fer entre el dimecres 24 i el divendres 26.

De la tercera generació:

- **Solament a la zones més primerenques del Baix Penedès i del Camp de Tarragona,** com són la zona litoral de Calafell i El Vendrell i la zona litoral de Constantí i Cambrils, s'ha iniciat el vol de la tercera generació.

Cendrosa

Estem detectant presència important d'aquesta malaltia, per tant cal extremar la vigilància i tractar si es detenten focus.

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

Nota

En tots els casos, cal fer el tractament el millor possible passant per les dues cares.

Olivera**Mosca de l'olivera. *Bactrocera oleae***

Ja ha aparegut la primera generació d'adults, en la que normalment no cal realitzar tractaments de caràcter general en la varietat arbequina.

Malgrat tot s'està detectant picada en finques concretes d'algunes zones i varietats molt primerenques com sevillena, grossal, morruda etc. per això cal fer un recompte de picades i recordeu que només cal tractar si es supera el llindar del 5%.

En agricultura ecològica, si s'utilitza captura massiva per al control de la plaga és recomanable col·locar els mosquers a mitjans d'aquest mes.

Fruiters:**Mosca de la fruita: *Ceratitis***

Aquest any les poblacions són molt elevades, cal estar atents des de l'inici del canvi de color per tal de protegir el període de maduració de les diferents varietats.

Presseguer i nectarina**Grafolita**

Cal protegir els fruits des del verolat fins a la collita.

Monilia

Les condicions d'alta humitat relativa són molt favorables per la propagació d'aquesta malaltia, cal extremar la vigilància a les finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

Aranya

Recomanem vigilar les plantacions i tractar si es supera el llindar de tolerància, recordeu que aquest té en compte la presència de fauna auxiliar.

Horta**ENCIAM****Erugues**

S'estan trobant erugues en enciam, cal vigilar les plantacions.

TOMÀQUET***Tuta absoluta***

Per a controlar aquesta plaga s'han d'integrar diferents mètodes entre els que hi ha la conservació dels enemics naturals, com són els insectes depredadors *Macrolophus* i *Nesidiocoris*, que ens seran de gran ajuda. És per això que amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb aquests individus.

Cuc del tomàquet o Heliothis

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen els primers atacs d'aquest àcar. Cal localitzar les primeres taques de color bronzejat a la part baixa i tractar localment. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

Cul negre

Amb l'augment de les temperatures pot aparèixer aquesta fisiopatia. Es recomana realitzar regs freqüents i poc abundants.

PATATA

Palometa de la patata

Per tal d'evitar l'atac d'aquesta plaga s'ha d'anar en compte a no deixar els tubercles arrencats al camp i evitar la formació d'esquerdes al terra.

Parcs i jardins

PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Entre l'inici de primavera i final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut. Cal seguir les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta en funció del tipus d'insecticida utilitzat.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: www.gencat.cat/agricultura