




Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Serveis Territorials de Tarragona
Sanitat Vegetal



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 26 de juliol 2013



Cultius:
Vinya, Olivera, Noguer, Presseguer i nectarina, Horta i Parcs i jardins

Vinya

Míldiu

Cal estar atents a l'aparició de taques especialment a les fulles tendres de la part terminal dels serments.

Cuc del raïm: Segona i tercera generació

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantroprol, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

De la segona generació solament quedava per avisar les zones tardanes de la Conca de Barberà, com són les parts altes de l'Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort, on el tractament de la màxima eclosió dels ous s'ha de fer entre el dimecres 24 i el divendres 26.

De la tercera generació:

-Baix Penedès:

- **A la zona costanera** de Calafell i El Vendrell, estem en període de posta d'ous la posta dels ous
- **A la zona interior** com l'Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i Banyeres s'ha iniciat el vol.

-Camp de Tarragona:

- **A la zona més primerenca** com la zona litoral de Constantí i Cambrils s'ha iniciat la posta dels ous.
- **A les zones mitjanes** de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Valls s'ha iniciat el vol.

-Priorat DO Montsant:

- **A les zones primerenques** com Garcia, Darmós, zones baixes d'Els Guiamets, d'El Masroig i d'el Molar, s'ha iniciat el vol.

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

Cendrosa

Estem detectant presència important d'aquesta malaltia, per tant cal extremar la vigilància i tractar si es detenten focus.

Nota

En tots els casos, cal fer el tractament el millor possible passant per les dues cares.

Olivera

Mosca de l'olivera. *Bactrocera oleae*

Ja ha aparegut la primera generació d'adults, en la que normalment no cal realitzar tractaments de caràcter general en la varietat arbequina.

Malgrat tot s'està detectant picada en finques concretes d'algunes zones i varietats molt primerenques com sevillena, grossal, morruda etc. per això cal fer un recompte de picades i recordeu que només cal tractar si es supera el llindar del 5%.

En agricultura ecològica, si s'utilitza captura massiva per al control de la plaga és recomanable col·locar els mosquers a mitjans d'aquest mes.

Noguer

Carpocapsa

Ens trobem en segona generació. Vigileu la finca i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

Fruïters:

Mosca de la fruita: *Ceratitis*

Aquest any les poblacions són molt elevades, cal estar atents des de l'inici del canvi de color per tal de protegir el període de maduració de les diferents varietats.

Presseguer i nectarina

Grafolita

Cal protegir els fruits des del verolat fins a la collita.

Monilia

Les condicions d'alta humitat relativa són molt favorables per la propagació d'aquesta malaltia, cal extremar la vigilància a les finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

Aranya

Recomanem vigilar les plantacions i tractar si es supera el llindar de tolerància, recordeu que aquest té en compte la presència de fauna auxiliar.

Horta

ENCIAM

Erugues

S'estan trobant erugues en enciam, cal vigilar les plantacions.

TOMÀQUET

Tuta absoluta

Per a controlar aquesta plaga s'han d'integrar diferents mètodes entre els que hi ha la conservació dels enemics naturals, com són els insectes depredadors *Macrolophus* i *Nesidiocoris*, que ens seran de gran ajuda. És per això que amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb aquests individus.

Cuc del tomàquet o *Heliothis*

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen els primers atacs d'aquest àcar. Cal localitzar les primeres taques de color bronzejat a la part baixa i tractar localment. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

Cul negre

Amb l'augment de les temperatures pot aparèixer aquesta fisiopatia. Es recomana realitzar regs freqüents i poc abundants.

PATATA

Palometa de la patata

Per tal d'evitar l'atac d'aquesta plaga s'ha d'anar en compte a no deixar els tubercles arrencats al camp i evitar la formació d'esquerdes al terra.

Parcs i jardins

PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Entre l'inici de primavera i final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut. Cal seguir les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta en funció del tipus d'insecticida utilitzat.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: www.gencat.cat/agricultura