



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 12 de juliol de 2016
Avís 43/2016

Cultius:

Vinya, avellaner, noguer, presseguer i nectarina i horta

Vinya:

Cuc del Raïm: Segona generació

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

- Ja es va donar l'avís a totes les comarques excepte a la Conca de Barberà
- **Conca de Barberà:**
 - **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà la màxima eclosió és diumenge 10, dilluns 11 i dimarts 12
 - **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga i de Sarral, la màxima eclosió és dilluns 11, dimarts 12 i dimecres 13.
 - **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort l'inici de l'eclosió és el dimecres 13 i dijous 14.

Míldiu

De moment no s'han produït noves contaminacions.

Cendrosa

Estem trobant focus, especialment en vinyes que no s'han descobert els raïms, cal vigilar

Avellaner:

Diabló

Zones de muntanya: A les finques amb poblacions altes ja es pot realitzar el segon tractament per protegir contra la picada de posta, entre divendres 8 i dimecres 13 de juliol.

Zeuzera

En aquelles finques amb nivells alts de plaga i que no es realitzi la confusió sexual, es recomana fer el primer dels dos tractaments entre dijous 6 i dimecres 13 de juliol.

Aranya

Recordeu que cal vigilar les plantacions per si s'observen símptomes i tractar en cas necessari.

Noguer:

Carpocapsa

S'ha iniciat el vol de la segona generació. Vigileu la finca i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

Presseguer i nectarina:

Mosca de la fruita o ceratitis

Recordem que cal anar protegint les varietats a mida que vagin entrant en el període de maduració des de l'inici del canvi de color.

Grafolita

Han augmentat les captures d'aquesta plaga. Cal protegir les finques tradicionalment afectades aquesta setmana.

Horta:

Tomaquera

Tuta absoluta

Les poblacions són baixes, però cal estar atents. Recordeu que els mírids depredadors ens poden fer un bon control de la plaga, a més a més d'ajudar-nos a controlar la mosca blanca. És per això que amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb aquests individus.

Cul negre

Amb l'augment de les temperatures pot aparèixer aquesta fisiopatia. Es recomana realitzar regs freqüents i poc abundants.

Patata

Escarabat de la patata

Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult) d'aquesta plaga s'ha de realitzar el tractament.

Palometa de la patata

Per tal d'evitar l'atac d'aquesta plaga s'ha d'anar en compte a no deixar els tubercles arrencats al camp i evitar la formació d'esquerdes al terra.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

ssv.t.daam@gencat.cat