




Generalitat de Catalunya  
Departament d'Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural  
Serveis Territorials de Tarragona  
Sanitat Vegetal



## Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 9 de juliol 2013



**Cultius:**  
**Vinya, Cirerer, Presseguer i nectarina, Avellaner, Horta i Parcs i jardins**

### Vinya

#### Cuc del raïm: Segona generació

#### Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

**-Baix Penedès:** ja es va donar l'avís.

#### -Camp de Tarragona:

- **A la zona més primerenca i a les zones mitjanes i tardanes** ja es va donar l'avís.
- **A les zones més tardanes** com parts altes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S<sup>a</sup> Maria, Les Destres, Les Pobles i les Planes de Cabra la màxima eclosió serà dimarts 9, dimecres 10 i dijous 11.

#### -Priorat DO Montsant:

- **A les zones primerenques i mitjanes** ja es va donar l'avís.
- **A les zones tardanes** de Cabacés, La Figuera, Margalef i La Bisbal la màxima eclosió serà dimarts 9, dimecres 10 i dijous 11.
- **A la zona més tardana** de Cornudella i Ulldemolins, l'inici d'eclosió serà dimarts 9 i dimecres 10

#### -Priorat DOQ Priorat:

- **A les zones primerenques** ja es va donar l'avís.
- **A la zona mitjana** com Gratallops, Vilella Alta i Baixa, Torroja, la màxima eclosió serà dimarts 9, dimecres 10 i dijous 11.
- **A la zona tardana** Porrera, Poboleda, Escala Dei, la Morera i el terme de Falset limítrof amb Porrera. La màxima eclosió serà dimecres 10, dijous 11 i divendres 12 .

#### -Conca de Barberà:

- **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà l'inici de l'eclosió dels ous serà dijous 11 i divendres 12.

**Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona**

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

- **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga i de Sarral, estem en període de posta dels ous.
- **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort s'ha iniciat el vol.

### **Míldiu**

En algunes zones on s'estan donant mullenes matinals, s'està detectant presència de la malaltia, principalment en la nova brotada. Recomanem revisar atentament les vinyes i tractar aquelles plantacions amb presència de míldiu actiu.

### **Cendrosa**

Estem detectant presència important d'aquesta malaltia, pel que cal extremar la vigilància. Recordem que el tercer tractament s'ha de fer quan el gra del raïm arriba a la mida de pèsol.

### **Nota**

En tots els casos, cal fer el tractament el millor possible passant per les dues cares.

## **Cirerer**

### ***Drosophila suzukii***

Si es detecta presència de la plaga o bé danys en fruit, es recomana mantenir protegida la cirera susceptible de ser picada.

Recordeu que la cirera que no es cull pot ser un focus d'infecció.

A la web del DAAM hi podeu consultar els mètodes de control, els productes autoritzats i els terminis de seguretat, que són els dies que han de passar entre el tractament i la collita.

## **Presseguer i nectarina**

### **Mosca de la fruita o Ceratitis**

S'estan detectant poblacions importants de Ceratitis, cal seguir protegint les varietats a mida que vagin entrant en el període de maduració des de l'inici del canvi de color.

### **Monilia**

Les condicions d'alta humitat relativa són molt favorables per la propagació d'aquesta malaltia, cal extremar la vigilància a les finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

### **Aranya**

Recomanem vigilar les plantacions i tractar si es supera el llindar de tolerància, recordeu que aquest té en compte la presència de fauna auxiliar.

## **Avellaner**

### **Diabló**

- **Zones tardanes de muntanya:** Estigueu atents al contestador per a l'avís de tractament contra la picada de posta.

### **Aranya**

Observeu la part interior dels avellaners que és per on s'inicien els primers símptomes

### **Zeuzera**

Ja s'ha donat l'avis del primer dels dos tractaments.

## **Horta**

### **ENCIAM**

#### **Erugues**

S'estan trobant erugues en enciam, cal vigilar les plantacions.

### **TOMÀQUET**

#### ***Tuta absoluta***

Per a controlar aquesta plaga s'han d'integrar diferents mètodes entre els que hi ha la conservació dels enemics naturals, com són els insectes depredadors *Macrolophus* i *Nesidiocoris*, que ens seran de gran ajuda. És per això que amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb aquests individus.

#### **Cuc del tomàquet o Heliothis**

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

#### **Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)**

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen els primers atacs d'aquest àcar. Cal localitzar les primeres taques de color bronzejat a la part baixa i tractar localment. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

#### **Cul negre**

Amb l'augment de les temperatures pot aparèixer aquesta fisiopatia. Es recomana realitzar regs freqüents i poc abundants.

### **PATATA**

#### **Palometa de la patata**

Per tal d'evitar l'atac d'aquesta plaga s'ha d'anar en compte a no deixar els tubercles arrencats al camp i evitar la formació d'esquerdes al terra.

## **Parcs i jardins**

### **PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)**

Entre l'inici de primavera i final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut. Cal seguir les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta en funció del tipus d'insecticida utilitzat.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: [www.gencat.cat/agricultura](http://www.gencat.cat/agricultura)