




Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Serveis Territorials de Tarragona
Sanitat Vegetal



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 10 de juliol 2013



Cultius:
Vinya, Cirerer, Presseguer i nectarina, Avellaner, Horta i Parcs i jardins

Vinya

Cuc del raïm: Segona generació

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

-Baix Penedès: ja es va donar l'avís.

-Camp de Tarragona:

- **A la zona més primerenca i a les zones mitjanes i tardanes** ja es va donar l'avís.
- **A les zones més tardanes** com parts altes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S^a Maria, Les Destres, Les Pobles i les Planes de Cabra la màxima eclosió serà dimarts 9, dimecres 10 i dijous 11.

-Priorat DO Montsant:

- **A les zones primerenques i mitjanes** ja es va donar l'avís.
- **A les zones tardanes** de Cabacés, La Figuera, Margalef i La Bisbal la màxima eclosió serà dimarts 9, dimecres 10 i dijous 11.
- **A la zona més tardana** de Cornudella i Ulldemolins, l'inici d'eclosió serà dimarts 9 i dimecres 10

-Priorat DOQ Priorat:

- **A les zones primerenques** ja es va donar l'avís.
- **A la zona mitjana** com Gratallops, Vilella Alta i Baixa, Torroja, la màxima eclosió serà dimarts 9, dimecres 10 i dijous 11.
- **A la zona tardana** Porrera, Poboleda, Escala Dei, la Morera i el terme de Falset limítrof amb Porrera. La màxima eclosió serà dimecres 10, dijous 11 i divendres 12 .

-Conca de Barberà:

- **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà l'inici de l'eclosió dels ous serà dijous 11 i divendres 12.

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

- **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga i de Sarral, estem en període de posta dels ous.
- **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort **també s'ha iniciat la posta dels ous.**

Míldiu

En algunes zones on s'estan donant mullenes matinals, s'està detectant presència de la malaltia, principalment en la nova brotada. Recomanem revisar atentament les vinyes i tractar aquelles plantacions amb presència de míldiu actiu.

Cendrosa

Estem detectant presència important d'aquesta malaltia, pel que cal extremar la vigilància. Recordem que el tercer tractament s'ha de fer quan el gra del raïm arriba a la mida de pèsol.

Nota

En tots els casos, cal fer el tractament el millor possible passant per les dues cares.

Cirerer

Drosophila suzukii

Si es detecta presència de la plaga o bé danys en fruit, es recomana mantenir protegida la cirera susceptible de ser picada.

Recordeu que la cirera que no es cull pot ser un focus d'infecció.

A la web del DAAM hi podeu consultar els mètodes de control, els productes autoritzats i els terminis de seguretat, que són els dies que han de passar entre el tractament i la collita.

Presseguer i nectarina

Mosca de la fruita o Ceratitis

S'estan detectant poblacions importants de Ceratitis, cal seguir protegint les varietats a mida que vagin entrant en el període de maduració des de l'inici del canvi de color.

Monilia

Les condicions d'alta humitat relativa són molt favorables per la propagació d'aquesta malaltia, cal extremar la vigilància a les finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

Aranya

Recomanem vigilar les plantacions i tractar si es supera el llindar de tolerància, recordeu que aquest té en compte la presència de fauna auxiliar.

Avellaner

Diabló

- **Zones tardanes de muntanya:** Estigueu atents al contestador per a l'avís de tractament contra la picada de posta.

Aranya

Observeu la part interior dels avellaners que és per on s'inicien els primers símptomes

Zeuzera

Ja s'ha donat l'avis del primer dels dos tractaments.

Horta

ENCIAM

Erugues

S'estan trobant erugues en enciam, cal vigilar les plantacions.

TOMÀQUET

Tuta absoluta

Per a controlar aquesta plaga s'han d'integrar diferents mètodes entre els que hi ha la conservació dels enemics naturals, com són els insectes depredadors *Macrolophus* i *Nesidiocoris*, que ens seran de gran ajuda. És per això que amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb aquests individus.

Cuc del tomàquet o Heliothis

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen els primers atacs d'aquest àcar. Cal localitzar les primeres taques de color bronzejat a la part baixa i tractar localment. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

Cul negre

Amb l'augment de les temperatures pot aparèixer aquesta fisiopatia. Es recomana realitzar regs freqüents i poc abundants.

PATATA

Palometa de la patata

Per tal d'evitar l'atac d'aquesta plaga s'ha d'anar en compte a no deixar els tubercles arrencats al camp i evitar la formació d'esquerdes al terra.

Parcs i jardins

PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Entre l'inici de primavera i final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut. Cal seguir les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta en funció del tipus d'insecticida utilitzat.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: www.gencat.cat/agricultura