




Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Serveis Territorials de Tarragona
Sanitat Vegetal



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 16 de juliol 2013



Cultius:

Vinya, Olivera, Presseguer i nectarina, Avellaner, Horta i Parcs i jardins

Vinya

Cuc del raïm: Segona generació

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantroprol, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

-Baix Penedès: ja es va donar l'avís.

-Camp de Tarragona: ja es va donar l'avís.

-Priorat DO Montsant: ja es va donar l'avís.

-Priorat DOQ Priorat: ja es va donar l'avís.

-Conca de Barberà:

- **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà la màxima eclosió és diumenge 14, dilluns 15 i dimarts 16.
- **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga i de Sarra, la màxima eclosió serà dimecres 17, dijous 18 i divendres 19.
- **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarra, Vimbodí i Rocafort està en període de posta dels ous.

Míldiu

A la zona de Sarra, Rocafort, Forès i Montbrí, on les pluges del passat dijous 11 de juliol, han estat superiors als 10 litres es recomana realitzar un tractament a partir de demà dimecres 17 amb productes penetrants.

En viticultura ecològica cal realitzar una protecció preventiva a partir de compostos cúprics.

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

Cendrosa

Estem detectant presència important d'aquesta malaltia, pel que cal extremar la vigilància. Recordem que el tercer tractament s'ha de fer quan el gra del raïm arriba a la mida de pèsol.

Nota

En tots els casos, cal fer el tractament el millor possible passant per les dues cares.

Olivera

Mosca de l'olivera. *Bactrocera oleae*

Ja ha aparegut la primera generació d'adults, en la que normalment no cal realitzar tractaments de caràcter general en la varietat arbequina, de tota manera cal estar atents. En agricultura ecològica, si s'utilitza captura massiva per al control de la plaga és recomanable col·locar els mosquers a mitjans d'aquest mes.

Presseguer i nectarina

Mosca de la fruita o Ceratitis

S'estan detectant poblacions importants de Ceratitis, cal seguir protegint les varietats a mida que vagin entrant en el període de maduració des de l'inici del canvi de color.

Monilia

Les condicions d'alta humitat relativa són molt favorables per la propagació d'aquesta malaltia, cal extremar la vigilància a les finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

Aranya

Recomanem vigilar les plantacions i tractar si es supera el llindar de tolerància, recordeu que aquest té en compte la presència de fauna auxiliar.

Avellaner

Diabló

- **Zones tardanes de muntanya:** Ja es pot realitzar el segon tractament per protegir contra la picada de posta des d'avui dia 12 fins dimarts 16

Borró sec

A les finques afectades es recomana realitzar el tractament contra aquesta malaltia a partir del dia 13 fins el dia 20

Aranya

Observeu la part interior dels avellaners que és per on s'inicien els primers símptomes

Horta

ENCIAM

Erugues

S'estan trobant erugues en enciam, cal vigilar les plantacions.

TOMÀQUET

Tuta absoluta

Per a controlar aquesta plaga s'han d'integrar diferents mètodes entre els que hi ha la conservació dels enemics naturals, com són els insectes depredadors *Macrolophus* i *Nesidiocoris*, que ens seran de gran ajuda. És per això que amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb aquests individus.

Cuc del tomàquet o *Heliothis*

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen els primers atacs d'aquest àcar. Cal localitzar les primeres taques de color bronzejat a la part baixa i tractar localment. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

Cul negre

Amb l'augment de les temperatures pot aparèixer aquesta fisiopatia. Es recomana realitzar regs freqüents i poc abundants.

PATATA

Palometa de la patata

Per tal d'evitar l'atac d'aquesta plaga s'ha d'anar en compte a no deixar els tubercles arrencats al camp i evitar la formació d'esquerdes al terra.

Parcs i jardins

PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Entre l'inici de primavera i final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut. Cal seguir les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta en funció del tipus d'insecticida utilitzat.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: www.gencat.cat/agricultura