




Generalitat de Catalunya  
Departament d'Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural  
Serveis Territorials de Tarragona  
Sanitat Vegetal



## Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 19 de juliol 2013



**Cultius:**  
**Vinya, Olivera, Presseguer i nectarina, Avellaner, Horta i Parcs i jardins**

### Vinya

#### Míldiu

Les pluges que s'estan produint entre ahir i avui, estan afectant amb importància al Baix Penedès, Camp de Tarragona i Conca de Barberà, arribant a superar en alguns llocs els 50 litres. En aquestes tres comarques, caldrà fer un tractament general quan es pugui entrar a les vinyes, preferiblement i si és possible entre el dilluns 22 i el dimecres 25. Es recomana utilitzar productes penetrants o bé sistèmics si en la parcel·la es troben taques o raïms afectats per la malaltia.

En viticultura ecològica cal seguir mantenint ben protegides les vinyes amb compostos cúprics.

#### Cuc del raïm: Segona generació

##### Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

##### Ens trobem al final de la segona generació i solament queda per avisar la Conca de Barberà:

- **A les zones primerenques** ja es va donar l'avis.
- **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga i de Sarral, la màxima eclosió serà dimecres 17, dijous 18 i divendres 19.
- **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort el tractament de l'inici de l'eclosió dels ous s'ha de fer el dissabte 20 i el diumenge 21.

**Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona**

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

### **Cendrosa**

Estem detectant presència important d'aquesta malaltia, per tant cal extremar la vigilància i tractar si es detenten focus.

### **Nota**

En tots els casos, cal fer el tractament el millor possible passant per les dues cares.

## **Olivera**

### **Mosca de l'olivera. *Bactrocera oleae***

Ja ha aparegut la primera generació d'adults, en la que normalment no cal realitzar tractaments de caràcter general en la varietat arbequina.

Malgrat tot s'està detectant picada en finques concretes d'algunes zones i varietats molt primirenques com sevillenca, grossal, morruda etc. per això cal fer un recompte de picades i recordeu que només tractar si es supera el llindar del 5%.

En agricultura ecològica, si s'utilitza captura massiva per al control de la plaga és recomanable col·locar els mosquers a mitjans d'aquest mes.

## **Fruiters:**

### **Mosca de la fruita: *Ceratitis***

Aquest any les poblacions són molt elevades, cal estar atents des de l'inici del canvi de color per tal de protegir el període de maduració de les diferents varietats.

## **Presseguer i nectarina**

### **Grafolita**

Cal protegir els fruits des del verolat fins a la collita.

### **Monilia**

Les condicions d'alta humitat relativa són molt favorables per la propagació d'aquesta malaltia, cal extremar la vigilància a les finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

### **Aranya**

Recomanem vigilar les plantacions i tractar si es supera el llindar de tolerància, recordeu que aquest té en compte la presència de fauna auxiliar.

## **Horta**

### **ENCIAM**

#### **Ergues**

S'estan trobant ergues en enciam, cal vigilar les plantacions.

## **TOMÀQUET**

### ***Tuta absoluta***

Per a controlar aquesta plaga s'han d'integrar diferents mètodes entre els que hi ha la conservació dels enemics naturals, com són els insectes depredadors *Macrolophus* i *Nesidiocoris*, que ens seran de gran ajuda. És per això que amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb aquests individus.

### **Cuc del tomàquet o Heliothis**

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

### **Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)**

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen els primers atacs d'aquest àcar. Cal localitzar les primeres taques de color bronzejat a la part baixa i tractar localment. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

### **Cul negre**

Amb l'augment de les temperatures pot aparèixer aquesta fisiopatia. Es recomana realitzar regs freqüents i poc abundants.

## **PATATA**

### **Palometa de la patata**

Per tal d'evitar l'atac d'aquesta plaga s'ha d'anar en compte a no deixar els tubercles arrencats al camp i evitar la formació d'esquerdes al terra.

## **Parcs i jardins**

### **PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)**

Entre l'inici de primavera i final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut. Cal seguir les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta en funció del tipus d'insecticida utilitzat.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: [www.gencat.cat/agricultura](http://www.gencat.cat/agricultura)