



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 04 de juny de 2015
Avís 24/2015

Cultius:

Vinya, avellaner, noguer, cirerer, presseguer i nectarina, horta i parcs i jardins

Vinya

Cuc del Raïm

Al Baix Penedès i a l'Alt Camp ja s'està iniciant el vol de la segona generació.

Míldiu

De moment s'han localitzat taques a les comarques del Priorat, El Baix Penedès i la primera taca al Camp de Tarragona. Resta localitzar la segona al Camp de Tarragona i les de la Conca de Barberà. De moment, cal estar atents a com evoluciona la meteorologia. En cas de trobar noves taques, cal trucar al tècnic de l'ADV o a aquest servei.

Cendrosa

Recordem la importància dels tractaments preventius. El tercer s'haurà de fer quan el gra de raïm arribi a la mida d'un pèsol.

**Podridura
grisa**

Recordem que el primer tractament preventiu s'ha de fer al final de la floració, a la caiguda dels capitells florals.

Avellaner

Diabló

Zones de muntanya: A les finques amb poblacions altes a partir de dilluns dia 8 ja es pot realitzar el primer tractament contra la picada alimentària.

Noguer:

Carpocapsa

Ja ens trobem en primera generació, per tant cal iniciar la protecció adequada contra aquesta plaga.

Antracnosi

Recordeu que el segon tractament s'ha de fer al quallat del fruit i el tercer quinze dies més tard

Cirerer

Drosophila suzukii

Actualment les poblacions són baixes. Igualment, en aquelles finques en les que s'observin danys es recomana protegir aquelles varietats que es trobin en maduració ja que és el període de màxima susceptibilitat.

Recordeu que és molt important gestionar correctament el rebuig de cirera. També és important retirar i destruir els fruits sobremadurats dels arbres així com els fruits caiguts a terra.

Aviseu a aquest Servei si es detecten danys.

[Full informatiu](#)

Presseguer i nectarina

Mosca de la fruita o ceratitis

Ja s'han localitzat les primeres captures a la zona primerenca del Baix Camp. A partir d'ara, cal anar protegint les varietats des de l'inici del canvi de color.

Cítrics

Mosca de la fruita o ceratitis

Ja estem detectant presència de mosca en varietats tardanes. Cal doncs protegir la fruita prestant atenció al termini de seguretat.

Horta:

Horta en general

Pugó i erugues

Vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus.

Tomàquet

Tuta absoluta

Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis* respectuós amb la fauna auxiliar.

Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen els primers atacs d'aquest àcar. Acostuma a atacar la part inferior de la planta i s'escampa ràpidament cap a la part superior. Cal localitzar els primers focus i tractar les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

Mongeta

Aranya

Vigileu la seva presència i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació.

Parcs i jardins:

Palmeres

Morrut

Des de primavera i fins a final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el

morrut. Cal seguir les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta en funció del tipus d'insecticida utilitzat.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

ssv.t.daam@gencat.cat