




Generalitat de Catalunya  
Departament d'Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural  
Serveis Territorials de Tarragona  
Sanitat Vegetal



## Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 14 de juny 2013



Cultius:

**Vinya, Cirerers, Presseguer i nectarina, Ametller, Avellaner, Noguer, Horta i Parcs i jardins**

### Vinya

#### Míldiu

Confirmem que ja s'han localitzat taques a totes les comarques. Després de les darreres pluges dels passats dies 8 i 9, justament quan ens trobem en el període més sensible de floració-quallat, recordem que hem aconsellat, en caràcter general, renovar la protecció entre el dijous 13 i el dissabte 15, utilitzant preferentment productes sistèmics o penetrants.

En agricultura ecològica també és necessari renovar la protecció.

En tots els casos, cal fer el tractament el millor possible passant per les dues cares.

#### Cendrosa

Recordem que el segon tractament s'ha de fer a l'inici de floració si s'utilitzen productes líquids o en plena floració si es fa amb sofre pols per espolvoreig.

### Cirerers

#### *Drosophila Suzukii*

Durant aquesta setmana les captures han començat a augmentar, cal estar atents per si s'observen danys en les varietats tardanes.

Recordeu que la cirera que no es cull pot ser un focus d'infecció.

A la web del DAAM hi podeu consultar els mètodes de control, els productes autoritzats i els terminis de seguretat, que són els dies que han de passar entre el tractament i la collita.

### Presseguer i nectarina

#### Mosca de la fruita o Ceratitis

S'han tornat a localitzar caputres a la zona litoral del Baix Camp. Cal seguir protegint les varietats a mida que vagin entrant en el període de maduració des de l'inici del canvi de color.

**Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona**

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

### **Monilia**

Les condicions d'alta humitat relativa són molt favorables per la propagació d'aquesta malaltia, cal extremar la vigilància a les finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

## **Ametller**

### **Brot sec o fusicoccum**

Recordem que també durant el mes de juny cal protegir els ametllers sensibles si es produeixen pluges o mullenes

## **Avellaner**

### **Diabló**

- **Part baixa del camp de Tarragona:** manteniu-vos atents al contestador pel tractament contra picada de posta.

- **Zones tardanes de muntanya:** estem detectant poblacions elevades, manteniu-vos atents al contestador pel tractament contra la picada alimentícia.

### **Aranya**

Observeu la part interior dels avellaners que és per on s'inicien els primers símptomes

## **Noguer**

### **Carpocapsa**

Vigileu la finca i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament

## **Horta**

### **Pugó**

Aquest any estem trobant pugó en diferents cultius, vigileu les plantacions i tracteu en cas necessari.

### **CEBA, ENCIAM I PATATA, Míldiu**

Recordeu que en condicions de pluja i humitat i temperatures suaus s'afavoreix l'aparició d'aquestes malalties, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

### **TOMÀQUET**

#### ***Tuta absoluta***

Per a controlar aquesta plaga s'han d'integrar diferents mètodes entre els que hi ha la conservació dels enemics naturals, com són els insectes depredadors *Macrolophus* i *Nesidiocoris*, que ens seran de gran ajuda. És per això que amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb aquests individus.

#### **Bacteriosis del tomàquet**

Les elevades humitats durant la primavera han afavorit l'aparició de malalties bacterianes. Cal mantenir els cultius airejats per a evitar les altes humitats i aplicar compostos cúprics.

## **PATATA**

### **Escarabat de la patata**

Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult) d'aquesta plaga s'ha de realitzar el tractament.

### **Palometa de la patata**

Per tal d'evitar l'atac d'aquesta plaga s'ha d'anar en compte a no deixar els tubercles arrencats al camp i evitar la formació d'esquerdes al terra.

## **Parcs i jardins**

### **PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)**

Entre l'inici de primavera i final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut. Cal seguir les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta en funció del tipus d'insecticida utilitzat.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: [www.gencat.cat/agricultura](http://www.gencat.cat/agricultura)