



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avis del dia: 11 de juny de 2012



Cultius:

Vinya, Noguer, Avellaner, Ametller, presseguer i nectarina, Cítrics i Horta

Vinya

Cuc del raïm: Segona generació

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantriprol, flufenoxuron, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: Bacillus thuringiensis, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

-Baix Penedès:

- **A la zona costanera** de Calafell i El Vendrell just s'ha iniciat la posta dels ous.
- **A la zona interior** com l'Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i Banyeres s'ha iniciat el vol.

-Camp de Tarragona:

- **A la zona més primerenca** com la zona litoral de Constantí i Cambrils i **a les zones mitjanes** de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Valls s'ha iniciat el vol.
- **A les zones tardanes** encara no s'ha iniciat el vol, cal estar atents.

-Priorat DO Montsant:

- **A les zones primerenques** com Garcia, Darmós, zones baixes d'Els Guiamets i d'El Masroig, s'ha iniciat el vol.
- **A les zones mitjanes i tardanes** encara no s'ha iniciat el vol, cal estar atents.

-Priorat DO Montsant i Conca de Barberà: encara no s'ha iniciat el vol, cal estar atents.

Mildiu

Ja s'han localitzat taques a totes les comarques. De moment els risc és baix i les condicions no són favorables.

Agricultura ecològica: En les parcel·les de producció ecològica, on solament es poden utilitzar productes preventius a base de coure, ja vam avisar d'iniciar la protecció. Ara cal estar atents a la meteorologia.

Cendrosa

Recordem que el tercer tractament s'ha de fer quan els grans del raïm arribin a la mida d'un pèsol.

Podridura grisa o Botrytis

En les zones i varietats sensibles, el primer tractament s'ha de fer al final de la floració quan es produeix la caiguda dels capitells florals.

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

Noguer

Carpocapsa

Ja es poden trobar fruits atacats. Vigileu la finca i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

Avellaner

Aranya

Vigileu la part interior dels avellaners que és per on s'observen els primers símptomes.

Diabló

Manteniu-vos atents al contestador.

Ametller

Brot sec o fusicocum

Recordem que també durant el més de juny cal protegir els ametllers sensibles si es produeixen pluges o mullenes.

Presseguer i nectarina:

Mosca de la fruita: Ceratits

Ja s'han detectat les primeres captures a la comarca del Baix Camp. Es recomana iniciar la protecció de la fruita a partir del canvi de color i que es trobi en procés de maduració.

Monilia

S'ha trobat algun fruit afectat, si les condicions són favorables es recomana protegir les varietats que estiguin a punt de collir.

Cítrics:

Poll gris

Estem amb plena naixença de les larves, és el moment de tractar aquelles finques afectades.

Horta

TOMÀQUET

Tuta absoluta

Per a controlar aquesta plaga s'han d'integrar diferents mètodes entre els que hi ha la conservació dels enemics naturals, com són els insectes depredadors *Macrolophus* i *Nesidiocoris*, que ens seran de gran ajuda. És per això que amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb aquests individus.

Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen els primers atacs d'aquest àcar. Acostuma a atacar la part inferior de la planta i s'escampa ràpidament cap a la part superior. Cal localitzar els primers focus i tractar les plantes afectades. El sofre controla bé de la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

CEBA I PATATA

Míldiu

Vigileu les plantacions i protegiu en cas de ser necessari.

MONGETA

Aranya

Vigileu la seva presència i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació.

Altres

Atenció a la nova plaga de *Drosophila Suzukii* que pot afectar a maduixes, cireres, prunes, albercocs, préssec i vinya.

Cal estar atents i avisar a aquest servei si es detecten els primers símptomes, així com seguir les recomanacions d'aquest contestador en el que anirem informant sobre l'evolució de la plaga.

Recordem que de moment no s'han detectat danys a la demarcació i les captures en els punts de control es mantenen baixes.