




Generalitat de Catalunya  
Departament d'Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural  
Serveis Territorials de Tarragona  
Sanitat Vegetal



## Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 21 de juny 2013



Cultius:

**Vinya, Cirerers, Olivera, Presseguer i nectarina, Ametller, Avellaner, Noguera, Horta i Parcs i jardins**

### Vinya

#### Calamarsa

Alguns indrets de la comarca del Priorat, especialment en zones de la DOQ Priorat, el passat dimarts 18 van estar afectats per calamarsa. En les zones on la presència de ferides en raïm i serment justifiquin un tractament, pot utilitzar-se una barreja de folpet amb coure.

#### Cuc del raïm: Segona generació

##### Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocid.

Inici d'eclosió: Bacillus thuringiensis, emamectina, spinosad, tebufenocid,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

##### -Baix Penedès:

- **A la zona costanera** de Calafell i El Vendrell, l'inici d'eclosió dels ous serà diumenge 23, dilluns 24 i dimarts 25.
- **A la zona interior** com l'Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i Banyeres estem en el període de posta d'ous.

##### -Camp de Tarragona:

- **A la zona més primerenca** com la zona litoral de Constantí i Cambrils l'inici d'eclosió dels ous serà diumenge 23, dilluns 24 i dimarts 25.
- **a les zones mitjanes** de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Valls s'ha iniciat la posta dels ous.
- **A les zones tardanes** com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes de Vilardona, del Pont d'Armentera, del Pla de S<sup>a</sup> Maria, Rodonyà, Masllorenç s'ha iniciat el vol.

##### -Priorat DO Montsant:

- **A les zones primerenques** com Garcia, Darmós, zones baixes d'Els Guiamets, d'El Masroig i d'el Molar, s'ha iniciat la posta dels ous.

**Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona**

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

- **A les zones mitjanes** com zones altes d'Els Guiamets, d'El Masroig, La Serra d'Almós, Capçanes, El Molar, Marçà, Falset, Pradell de la Teixeta i La Torre de Fontaubella s'ha iniciat el vol.

**-Priorat DOQ Priorat:**

- **A les zones primerenques** com Bellmunt, Lloar i El Molar, s'ha iniciat el vol.

**-Conca de Barberà:** encara no s'ha iniciat el vol, cal estar atents.

### **Míldiu**

Després del tractament recomanat per la passada setmana, entre dijous 13 i el dissabte 15, considerem que les vinyes estan protegides.

En agricultura ecològica cal mantenir la protecció.

### **Cendrosa**

Estem detectant presència important d'aquesta malaltia, pel que cal extremar la vigilància. Recordem que el tercer tractament s'ha de fer quan el gra del raïm arriba a la mida de pèsol.

### **Nota**

En tots els casos, cal fer el tractament el millor possible passant per les dues cares.

## **Cirerers**

### ***Drosophila suzukii***

Durant aquesta setmana les captures han seguit augmentant i s'han observat alguns danys. Si es detecta presència de la plaga o bé danys en fruit, es recomana mantenir protegida la cirera susceptible de ser picada.

Recordeu que la cirera que no es cull pot ser un focus d'infecció.

A la web del DAAM hi podeu consultar els mètodes de control, els productes autoritzats i els terminis de seguretat, que són els dies que han de passar entre el tractament i la collita.

## **Olivera**

### **Punxò o *Prays oleae***

S'ha de tenir en compte que en la nostra zona, en varietat arbequina, es veu poc afectada per aquesta plaga, on la fauna auxiliar conjuntament amb les altes temperatures són capaces de fer un bon control.

No obstant, en aquelles finques que tradicionalment estiguin molt afectades, especialment en cultiu en superintensiu, cal estar atents al contestador ja que estem en el període de posta d'ous sobre l'oliva.

## **Presseguer i nectarina**

### **Mosca de la fruita o *Ceratitis***

Cal seguir protegint les varietats a mida que vagin entrant en el període de maduració des de l'inici del canvi de color.

### **Monilia**

Les condicions d'alta humitat relativa són molt favorables per la propagació d'aquesta malaltia, cal extremar la vigilància a les finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

## **Ametller**

### **Brot sec o fusicoccum**

Recordem que també durant el mes de juny cal protegir els ametllers sensibles si es produeixen pluges o mullenes

## **Avellaner**

### **Diabló**

- **Part baixa del camp de Tarragona:** A partir del dia 21 en aquelles finques afectades ja es pot realitzar el segon tractament per protegir contra la picada de posta.

- **Zones tardanes de muntanya:** A partir del dia 21 ja es pot realitzar el primer tractament per protegir contra la picada alimentícia, recordem que en aquesta zona estem detectant poblacions elevades

### **Aranya**

Observeu la part interior dels avellaners que és per on s'inicien els primers símptomes

## **Noguer**

### **Carpocapsa**

Vigileu la finca i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament

## **Horta**

### **Pugó**

Aquest any estem trobant pugó en diferents cultius, vigileu les plantacions i tracteu en cas necessari.

### **CEBA, ENCIAM I PATATA, Mildiu**

Recordeu que en condicions de pluja i humitat i temperatures suaus s'afavoreix l'aparició d'aquestes malalties, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

### **TOMÀQUET**

#### ***Tuta absoluta***

Per a controlar aquesta plaga s'han d'integrar diferents mètodes entre els que hi ha la conservació dels enemics naturals, com són els insectes depredadors *Macrolophus* i *Nesidiocoris*, que ens seran de gran ajuda. És per això que amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb aquests individus.

#### **Bacteriosis del tomàquet**

Les elevades humitats durant la primavera han afavorit l'aparició de malalties bacterianes. Cal mantenir els cultius airejats per a evitar les altes humitats i aplicar compostos cúprics.

## **PATATA**

### **Escarbat de la patata**

Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult) d'aquesta plaga s'ha de realitzar el tractament.

### **Palometa de la patata**

Per tal d'evitar l'atac d'aquesta plaga s'ha d'anar en compte a no deixar els tubercles arrencats al camp i evitar la formació d'esquerdes al terra.

## **Parcs i jardins**

### **PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)**

Entre l'inici de primavera i final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut. Cal seguir les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta en funció del tipus d'insecticida utilitzat.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: [www.gencat.cat/agricultura](http://www.gencat.cat/agricultura)