




Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Serveis Territorials de Tarragona
Sanitat Vegetal



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 25 de juny 2013



Cultius:

Vinya, Cirerer, Olivera, Presseguer i nectarina, Ametller, Avellaner, Noguera, Horta i Parcs i jardins

Vinya

Cuc del raïm: Segona generació

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantroprol, indoxacarb, metoxifenocida.

Inici d'eclosió: Bacillus thuringiensis, emamectina, spinosad, tebufenocida,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

-Baix Penedès:

- **A la zona costanera** de Calafell i El Vendrell, el tractament de màxima eclosió serà dimecres 26, dijous 27 i divendres 28.
- **A la zona interior** com l'Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i Banyeres l'inici de l'eclosió dels ous serà el dijous 27 i el divendres 28.

-Camp de Tarragona:

- **A la zona més primerenca** com la zona litoral de Constantí i Cambrils el tractament de màxima eclosió serà demà dimecres 26, dijous 27 i divendres 28.
- **a les zones mitjanes** de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Valls l'inici de l'eclosió dels ous serà el dijous 27 i el divendres 28.
- **A les zones tardanes** com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes de Vila-rodonà, del Pont d'Armentera, del Pla de S^a Maria, Rodonyà, Masllorenç s'ha iniciat el vol.

-Priorat DO Montsant:

- **A les zones primerenques** com Garcia, Darmós, zones baixes d'Els Guiamets, d'El Masroig i d'el Molar, s'ha iniciat la posta dels ous.
- **A les zones mitjanes** com zones altes d'Els Guiamets, d'El Masroig, La Serra d'Almós, Capçanes, El Molar, Marçà, Falset, Pradell de la Teixeta i La Torre de Fontaubella s'ha iniciat el vol.

-Priorat DOQ Priorat:

- **A les zones primerenques** com Bellmunt, Lloar i El Molar, s'ha iniciat el vol.

-Conca de Barberà:

- **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà i **A les zones mitjanes** com

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga s'ha iniciat el vol.

Míldiu

De moment no s'han produït noves contaminacions, però cal estar atents.

Cendrosa

Estem detectant presència important d'aquesta malaltia, pel que cal extremar la vigilància. Recordem que el tercer tractament s'ha de fer quan el gra del raïm arriba a la mida de pèsol.

Nota

En tots els casos, cal fer el tractament el millor possible passant per les dues cares.

Cirerer

Drosophila suzukii

Durant aquesta setmana les captures han seguit augmentant i s'han observat alguns danys. Si es detecta presència de la plaga o bé danys en fruit, es recomana mantenir protegida la cirera susceptible de ser picada.

Recordeu que la cirera que no es cull pot ser un focus d'infecció.

A la web del DAAM hi podeu consultar els mètodes de control, els productes autoritzats i els terminis de seguretat, que són els dies que han de passar entre el tractament i la collita.

Olivera

Punxó o *Prays oleae*

S'ha de tenir en compte que en la nostra zona, en varietat arbequina, es veu poc afectada per aquesta plaga, on la fauna auxiliar conjuntament amb les altes temperatures són capaces de fer un bon control.

No obstant, en aquelles finques que tradicionalment estiguin molt afectades, especialment en cultiu superintensiu, cal realitzar un tractament des de dimarts dia 25 fins divendres 28.

Presseguer i nectarina

Mosca de la fruita o *Ceratitis*

Cal seguir protegint les varietats a mida que vagin entrant en el període de maduració des de l'inici del canvi de color.

Monilia

Les condicions d'alta humitat relativa són molt favorables per la propagació d'aquesta malaltia, cal extremar la vigilància a les finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

Ametller

Brot sec o *fusicoccum*

Recordem que també durant el mes de juny cal protegir els ametllers sensibles si es produeixen pluges o mullenes

Avellaner

Diabló

- **Part baixa del camp de Tarragona:** A partir del dia 21 en aquelles finques afectades ja es pot realitzar el segon tractament per protegir contra la picada de posta.
- **Zones tardanes de muntanya:** A partir del dia 21 ja es pot realitzar el primer tractament per protegir contra la picada alimentícia, recordem que en aquesta zona estem detectant poblacions elevades

Aranya

Observeu la part interior dels avellaners que és per on s'inicien els primers símptomes

Noguer

Carpocapsa

Vigileu la finca i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament

Horta

Pugó

Aquest any estem trobant pugó en diferents cultius, vigileu les plantacions i tracteu en cas necessari.

CEBA, ENCIAM I PATATA, Mildiu

Recordeu que en condicions de pluja i humitat i temperatures suaus s'afavoreix l'aparició d'aquestes malalties, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

TOMÀQUET

Tuta absoluta

Per a controlar aquesta plaga s'han d'integrar diferents mètodes entre els que hi ha la conservació dels enemics naturals, com són els insectes depredadors *Macrolophus* i *Nesidiocoris*, que ens seran de gran ajuda. És per això que amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb aquests individus.

Bacteriosis del tomàquet

Les elevades humitats durant la primavera han afavorit l'aparició de malalties bacterianes. Cal mantenir els cultius airejats per a evitar les altes humitats i aplicar compostos cúprics.

PATATA

Escarabat de la patata

Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult) d'aquesta plaga s'ha de realitzar el tractament.

Palometa de la patata

Per tal d'evitar l'atac d'aquesta plaga s'ha d'anar en compte a no deixar els tubercles arrencats al camp i evitar la formació d'esquerdes al terra.

Parcs i jardins

PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Entre l'inici de primavera i final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut. Cal seguir les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta en funció del tipus d'insecticida utilitzat.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: www.gencat.cat/agricultura