



## Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

**Avís del dia:** 06 de maig de 2014  
**Avís 19/2014**

**Cultius:**

**Vinya, olivera, ametller, noguer, avellaner, presseguer i nectarina, cirerer, horta i forestals, parcs i jardins.**

### Vinya:

**Míldiu:**

Ja hem localitzat les primeres taques al Camp de Tarragona, concretament a Perafort i Constantí. Aquestes taques venen de les pluges dels dies 20 i 21. A la resta de comarques no tenim encara notícies de taques. En cas afirmatiu cal avisar a aquest servei o als tècnics de les ADV. De moment no s'aconsella fer tractaments però si estar atents i pendents de com evoluciona la climatologia els propers dies.

En el cas de les finques en producció ecològica, a la zona primerenca del Camp de Tarragona, si que és convenient iniciar la protecció amb productes cúprics.

**Cendrosa:**

Recordem la importància dels tractaments preventius. El primer s'ha de fer a l'inici de la brotada, quan aquesta arribi als 10-12 cm. de longitud.

### Ametller:

**Brot sec o Fusicocum:**

A la zona litoral, a les finques amb varietats sensibles i amb problemes d'aquesta malaltia, recordem la necessitat de protegir els arbres durant el maig, especialment si es produeixen pluges i altes humitats.

**Pugó:**

A partir d'ara vigileu la presència de les primeres colònies de pugons en els brots tendres.

### Noguer:

**Carpocapsa**

Ja s'han iniciat les primeres captures d'adults. A les finques on es realitzi la confusió sexual ja s'han d'instal·lar els difusors.

**Bacteriosi**

Els tractaments preventius amb productes cúprics són bàsics pel control d'aquesta malaltia, i especialment en períodes de pluges:

- El primer tractament s'ha de fer a obertura de borrons
- El segon tractament es realitza a l'inici de la floració femenina.
- El tercer tractament es realitza al quallat del fruit

## Antracnosi

Recordeu que per controlar aquesta malaltia cal iniciar la protecció a l'inici de la floració femenina amb fungicides orgànics i realitzar el segon tractament al quallat del fruit.

## Avellaner :

### Pugó

Observeu el revers de les fulles per detectar les primeres colònies de pugó i tracteu només en cas necessari.

## Presseguer i nectarina:

### Cendrosa:

Recordem que cal protegir el fruit, especialment les varietats sensibles, des de caiguda de collarí fins l'enduriment de pinyol.

### Pugó:

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les brotades.

### Arrufat i cribat:

Com a conseqüència de les darreres pluges cal tenir protegits els presseguers.

## Cirerer:

### *Drosophila suzukii*:

Estem detectant un augment de les captures d'aquesta plaga en els punts de control. Cal estar atents ja que les condicions actuals són favorables pel seu desenvolupament.

En les zones on hi ha cirera primerenca cal extremar la vigilància. Recordeu que el període de màxima susceptibilitat és durant la maduració.

Productes amb autorització excepcional en cirerer: dimetotat 40%, piretrines 1,4%, spinosad 48%, spinetoram 25%.

Recordeu avisar a aquest servei si es detecten els primers danys.

## Horta:

## Tomàquet

### *Tuta absoluta*

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trapes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte.

## Ceba: Míldiu i *Stemphillium* i Enciam i Patata: Míldiu

Les altes humitats i les temperatures suaus afavoreixen l'aparició d'aquestes malalties, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

## All i fava

### Rovell

Vigileu les plantacions i en cas necessari tracteu.

## Enciam i Carxofa

### Pugó

Vigileu les vostres plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu.

## Col, coliflor i bròquil

### *Plutella xylostella*

S'estan observant danys per *Plutella*, cal estar atents per protegir les plantacions. Recordeu que els tractaments amb *Bacillus thuringensis* afegint-hi sucre donen bons resultats.

## Forestals, parcs i jardins

### Palmeres

#### Morrut

Des de primavera i fins a final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut. Cal seguir les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta en funció del tipus d'insecticida utilitzat.

Podeu trobar més informació al web del Departament: [www.gencat.cat/agricultura/sanitat](http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat)

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris:](#)

**Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)**

Avinguda de Catalunya, 50. 43002 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45 [ssv.t.daam@gencat.cat](mailto:ssv.t.daam@gencat.cat)

<http://www.gencat.cat/daam>