



## Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

**Avís del dia:** 18 de maig de 2012



**Cultius:**

**Vinya, Noguer, Ametller, presseguer i nectarina i Horta**

### Vinya

#### Mildiu

A la comarca del Baix Penedès ja s'han localitzat les primeres taques aïllades. En previsió de pluges en els propers dies, és aconsellable fer un tractament general a la comarca.

A la comarca del Priorat s'ha localitzat una sola taca a la zona més primerenca, de moment cal estar atents a veure com evoluciona la situació, no cal fer tractament per ara.

A la resta de comarques del Camp de Tarragona i Conca de Barberà de moment no s'han trobat taques, per tant cal estar atents i avisar immediatament a les ADV o a aquest servei si se'n troben. En aquestes circumstàncies no cal fer tractaments per ara i estar molt atents a veure com evoluciona la meteorologia i la informació d'aquest contestador.

Agricultura ecològica: En les parcel·les de producció ecològica, on solament es poden utilitzar productes preventius a base de coure, si cal iniciar la protecció dels ceps.

#### Cendrosa

Recordem la importància dels tractaments preventius, el segon dels quals s'ha de realitzar a l'inici de la brotada si es fa amb productes líquids o en plena floració si es fa amb sofre pols.

### Noguer

#### Carpocapsa

Ja ens trobem en primera generació, per tant cal iniciar la protecció adequada contra aquesta plaga.

#### Bacteriosi

Els tractaments preventius amb productes cúprics són essencials per controlar aquesta malaltia: Recordem que el tercer tractament es realitza quallat del fruit

#### Antracnosi

Cal realitzar el segon tractament al quallat del fruit i el tercer 15 dies més tard amb fungicides orgànics.

## Ametller

### Brot sec o fusicocum

Les condicions meteorològiques actuals són favorables per aquesta malaltia. Recordem la importància de protegir els arbres especialment a la zona litoral i a les finques amb problemes

## Presseguer i nectarina

### Post-floració:

#### Cendrosa

A les varietats molt sensibles, cal iniciar la protecció del fruit a partir d'un centímetre de diàmetre, i fins a l'enduriment del pinyol.

#### Pugó

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les plantacions

## Horta

### ENCIAM i CARXOFA

#### Pugó

Cal vigilar les plantacions i quan s'observin els primers atacs, tracteu per tal d'evitar la seva proliferació.

### CEBA I PATATA

#### Míldiu

Les humitats persistents i l'augment de temperatures diürnes afavoreixen l'aparició d'aquesta malaltia, vigileu les plantacions i protegiu en cas de ser necessari.

### TOMÀQUET

#### *Tuta absoluta*

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte.

### PATATA

#### Escarabat de la patata

Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult) d'aquesta plaga s'ha de realitzar el tractament.

## Altres

**Atenció a la nova plaga de *Drosophila Suzukii*** que pot afectar a **maduixes, cireres, prunes, albercocs, préssec i vinya.**

Cal estar atents i avisar a aquest servei si es detecten els primers símptomes, així com seguir les recomanacions d'aquest contestador en el que anirem informant sobre l'evolució de la plaga. De moment no s'han detectat danys a la demarcació