




Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Serveis Territorials de Tarragona
Sanitat Vegetal



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 24 de maig 2013



Cultius:

Vinya, Cirerers, Presseguer i nectarina, Ametller, Avellaner, Olivera, Noguera, Horta i Parcs i jardins

Vinya

Míldiu

Amb el darrer període de plugues que es va produir durant la setmana passada i aproximant-nos al període de floració, que és el més sensible a la malaltia, les condicions son molt favorables pel desenvolupament del míldiu. Per tant, hem aconsellat fer un tractament general durant aquesta setmana, a partir de que es pugui entrar a les vinyes, preferentment amb productes sistèmics o penetrants.

També és molt important estar atents a l'aparició de taques en les diferents comarques del Baix Penedés, Camp de Tarragona, Priorat i Conca de Barberà i en cas positiu avisar immediatament als tècnics de les ADV o bé directament a aquest servei.

Recordem que en cultiu ecològic, s'han de continuar mantenint les vinyes protegides mentres durin les actuals plugues.

Cendrosa

Recordem que el segon tractament s'ha de fer a l'inici de floració si s'utilitzen productes líquids o en plena floració si es fa amb sofre pols per espolvoreig.

Cirerers

Drosophila Suzukii

En la majoria de les finques estem detectant presència de la plaga i en algunes d'elles hem localitzat algun fruit picat. Davant aquesta situació, es recomana iniciar la protecció de tota la cirera susceptible de ser picada (color verd palla). A la web del DAAM hi podeu consultar els mètodes de control, els productes autoritzats i els terminis de seguretat, que són els dies que han de passar entre el tractament i la collita.

Recordeu que la cirera que no es cull pot ser un focus d'infecció.

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

Presseguer i nectarina

Mosca de la fruita o Ceratitis

Ja s'han localitzat les primeres captures i els primers fruits picats a la zona litoral del Baix Camp. A partir d'ara, cal anar protegint les varietats a mida que vagin entrant en el període de maduració des de l'inici del canvi de color.

Cendrosa

Cal protegir el fruit des de caiguda de collarí fins enduriment de pinyol.

Monilia

Les condicions d'alta humitat relativa són molt favorables per la propagació d'aquesta malaltia, cal extremar la vigilància a les finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

Cribat i arrufat:

Degut a la climatologia actual, a les finques que hi hagi afectació, cal renovar la protecció.

Pugó:

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les plantacions.

Ametller

Brot sec o fusococum

Després de les pluges dels darrers dies, les condicions són molt favorables per la malaltia. Per tant recordem de la necessitat de mantenir protegits els arbres.

Cribat i arrufat:

Degut a la climatologia actual, a les finques que hi hagi afectació, cal renovar la protecció

Avellaner

Diabló

Solament a les finques molt afectades de la part baixa del camp de Tarragona, ja es pot fer el primer tractament per protegir el cultiu de les picades alimentícies. Si no teniu molta afectació espereu-vos a fer el tractament en el moment de protegir contra la picada de posta. A les zones tardanes de muntanya manteniu-vos atents al contestador.

Noguer

Carpocapsa

Ja ens trobem en primera generació, per tan cal iniciar la protecció adequada contra aquesta plaga.

Bacteriosi

Les condicions actuals continuen sent favorables per la propagació de la malaltia, és important mantenir el cultiu protegit.

Antracnosi

Recordeu que el tercer tractament s'ha de realitzar 15 dies més tard del quallat del fruit amb fungicides orgànics

Horta

CARXOFERA

Pugó

Vigileu les plantacions i tracteu en cas necessari.

CEBA, Míldiu i *Stemphylium*

ENCIAM I PATATA, Míldiu

Recordeu que en condicions de pluja i humitat i temperatures suaus s'afavoreix l'aparició d'aquestes malalties, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

TOMÀQUET

Tuta absoluta

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte. Recordeu que en tomaquera petita pot causar danys a l'ull de la planta aturant-ne el creixement.

PATATA

Escarabat de la patata

Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult) d'aquesta plaga s'ha de realitzar el tractament.

Parcs i jardins

PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Entre l'inici de primavera i final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut en funció del tipus d'insecticida utilitzat i de les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: www.gencat.cat/agricultura