




Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Serveis Territorials de Tarragona
Sanitat Vegetal



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avis del dia: 31 de maig 2013



Cultius:

**Vinya, Cirerers, Presseguer i nectarina, Ametller, Avellaner, Noguer,
Horta i Parcs i jardins**

Vinya

Míldiu

De moment ja s'han localitzat les primeres taques al Tarragonès (al terme de Constantí) i al Priorat (als termes de La Vilella Baixa i d'El Molà). De moment no s'han produït noves pluges, però cal estar atents per si apareixen noves taques i en cas afirmatiu avisar immediatament als tècnics de les ADV o bé directament a aquest servei.

Cendrosa

Recordem que el segon tractament s'ha de fer a l'inici de floració si s'utilitzen productes líquids o en plena floració si es fa amb sofre pols per espolvoreig.

Cirerers

Drosophila Suzukii

Les captures de la darrera setmana han disminuït considerablement, tot i així s'observa algun fruit picat en alguna parcel·la. Si es detecta presència de la plaga o be danys en fruit, es recomana mantenir protegida la cirera susceptible de ser picada (a partir de color verd palla).

Recordeu que la cirera que no es cull pot ser un focus d'infecció.

A la web del DAAM hi podeu consultar els mètodes de control, els productes autoritzats i els terminis de seguretat, que són els dies que han de passar entre el tractament i la collita.

Presseguer i nectarina

Mosca de la fruita o Ceratitis

Ja s'han localitzat les primeres captures i els primers fruits picats a la zona litoral del Baix Camp. A partir d'ara, cal anar protegint les varietats a mida que vagin entrant en el període de maduració des de l'inici del canvi de color.

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

Cendrosa

Cal protegir el fruit des de caiguda de collarí fins enduriment de pinyol.

Monilia

Les condicions d'alta humitat relativa són molt favorables per la propagació d'aquesta malaltia, cal extremar la vigilància a les finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

Pugó:

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les plantacions.

Ametller

Brot sec o fusicocum

Recordem la importància de mantenir protegits els arbres especialment a la zona litoral i a les finques amb problemes per si es tornen a donar condicions d'humitat elevada.

Avellaner

Diabló

Ja es va donar l'avis contra la picada alimentícia a les finques molt afectades de la part baixa del camp de Tarragona.

A les zones tardanes de muntanya manteniu-vos atents al contestador.

Noguer

Carpocapsa

Les captures continuen sent elevades en aquesta primera generació, manteniu el cultiu protegit

Bacteriosi

Les condicions actuals continuen sent favorables per la propagació de la malaltia, és important mantenir el cultiu protegit.

Antracnosi

S'estant trobant fruits danyats, recordeu que el tercer tractament s'ha de realitzar 15 dies més tard del quallat del fruit amb fungicides orgànics.

Horta

Pugó

Aquest any estem trobant pugó en diferents cultius, vigileu les plantacions i tracteu en cas necessari.

CEBA, Míldiu i *Stemphylium*

ENCIAM I PATATA, Míldiu

Recordeu que en condicions de pluja i humitat i temperatures suaus s'afavoreix l'aparició d'aquestes malalties, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

TOMÀQUET

Tuta absoluta

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte. Recordeu que en tomaquera petita pot causar danys a l'ull de la planta aturant-ne el creixement.

PATATA

Escarabat de la patata

Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult) d'aquesta plaga s'ha de realitzar el tractament.

Parcs i jardins

PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Entre l'inici de primavera i final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut. Cal seguir les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta en funció del tipus d'insecticida utilitzat.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: www.gencat.cat/agricultura