



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 21 de març de 2014
Avís 11/2014

Cultius:
Ametller, presseguer i nectarina, avellaner i horta.

Ametller:

Varietats en post-floració: Pugó

A mesura que quedin lliures de les despulles florals o collarí, i es vegi l'ametlló com l'ungla es recomana realitzar el seu control.

Presseguer i nectarina:

Varietats en prefloració: Pugó i poll San Jose, arrufat i cribat

A les varietats tardanes que es trobin en botó rosa, es pot iniciar la protecció contra el pugó. En les finques afectades per poll de San Jose, també és el moment de fer el control. Sinó s'ha realitzat el tractament preventiu contra arrufat i cribat, es pot afegir un fungicida orgànic.

Nota: Recentment s'han produït modificacions en les autoritzacions d'algunes matèries actives, cal assegurar-se que els productes utilitzats estiguin autoritzats en prefloració.

Varietats en floració: Monilia

En les zones afectades cal extremar la vigilància i protegir els arbres que estiguin a inici de floració.

Nectarina:

Post-floració: Trips

Només caldrà tractar el trips a caiguda de pètals, si es preveu atac fort.

Avellaner :

Badoc

A les finques amb més d'un 15% de borrons afectats, es recomana realitzar un tractament a l'estadi de 3 a 6 fulles. Recordeu que cal mullar bé l'arbre i que aquest tractament ja no és efectiu a partir de l'estadi de 7 fulles.

Barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*)

Per mantenir les poblacions baixes és molt important en aquesta època fer una lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les galeries actives sobre les quals s'ha d'actuar mitjançant filferros, molles o xeringues.

Horta:

Ceba i calçot: Míldiu i *Stemphiliium* i Enciam: Míldiu

Les altes humitats i les temperatures suaus afavoreixen l'aparició d'aquestes malalties, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

All i fava

Rovell

Vigileu les plantacions i en cas necessari tracteu.

Carxofera

Cuc de la carxofa (*Gorthina xanthenes*)

Cal seguir controlant les larves d'aquest barrinador, per tal d'evitar que penetrin a l'interior de les fulles, ja que, una vegada a dins, els tractaments no són eficaços.

Enciam

Pugó

Es comencen a veure les primeres colònies, vigileu les vostres plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i video sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris:](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda de Catalunya, 50. 43002 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45 ssv.t.daam@gencat.cat
<http://www.gencat.cat/daam>