



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 7 de març de 2014
Avís 9/2014

Cultius:
Ametller, presseguer i nectarina, avellaner i noguer, horta i parcs i jardins.

Ametller:

Varietats en inici de floració: Monilia

A les finques on tradicionalment es produeixen atacs de la malaltia, es recomana realitzar un tractament a inici de floració.

Varietats en postfloració: Pugó

A mesura que quedin lliures de les despulles florals o collarí, i es vegi l'ametlló com l'ungla es recomana realitzar el seu control

Presseguer i nectarina:

Varietats en prefloració: Arrufat, cribat

A les finques on durant la campanya anterior s'hagi produït una forta afectació d'arrufat o cribat cal realitzar un tractament des de l'estadi B (borró inflat) fins a caiguda de pètals.

Varietats en prefloració: Pugó i poll San Jose

A les varietats que es trobin en botó rosa, es pot iniciar la protecció contra el pugó. En les finques afectades per poll de San Jose, també és el moment de fer el control.

Nota: Recentment s'han produït modificacions en les autoritzacions d'algunes matèries actives, cal assegurar-se que els productes utilitzats estiguin autoritzats en prefloració.

Varietats en inici de floració: Monila

En les zones afectades cal extremar la vigilància i protegir els arbres que estiguin a inici de floració .

Avellaner i noguer:

Barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*)

Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l'hivern per fer una lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les galeries actives sobre les quals s'ha d'actuar mitjançant filferros, molles o xeringues.

Horta:

Ceba i calçot

Míldiu

Les altes humitats i les temperatures suaus afavoreixen l'aparició d'aquesta malaltia, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

Alls

Rovell

Vigileu les plantacions i en cas necessari tracteu.

Patata

Es recomana utilitzar patata de sembra certificada i sembrar els tubercles sencers sense trossejar-los, per evitar problemes fitosanitaris posteriors

Carxofera

Cuc de la carxofa (*Gorthina xanthenes*)

Cal seguir controlant les larves d'aquest barrinador, per tal d'evitar que penetrin a l'interior de les fulles, ja que, una vegada a dins, els tractaments no són eficaços.

Enciam

Pugó

Es comencen a veure les primeres colònies, vigileu les vostres plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes.

Parcs i jardins

Palmeres

Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Entre els mesos de desembre i febrer era el moment de realitzar la poda de les palmeres.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i video sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris:](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda de Catalunya, 50. 43002 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45 ssv.t.daam@gencat.cat

<http://www.gencat.cat/daam>