



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 01 d'abril de 2015
Avís 10/2015

Cultius:

Olivera, vinya, avellaner, ametller, noguer, presseguer i nectarina, horta i parcs i jardins

Olivera

Repilo "ull de gall":

Durant aquests mesos és el període crític per a les infeccions d'aquesta malaltia. Degut a les últimes pluges, es recorda que a les zones on hi hagi presència important d'inòcul, com taques a les fulles, i amb elevada humitat ambiental cal mantenir protegida la nova brotada des de l'inici.

Mesures culturals com podes que afavoreixin la ventilació dels arbres o un adobat nitrogenat equilibrat contribueixen a disminuir la incidència d'aquesta malaltia.

Vinya

Corc del raïm. Confusió sexual

A les zones més primerenques aviat s'iniciarà el vol de la primera generació del corc del raïm.

En aquelles zones on s'utilitzi la confusió sexual s'han de tenir present les següents recomanacions:

- Els difusors han de col·locar-se just a l'inici de la primera generació, quan es produeixen les primeres captures.
- Cal fer superfícies àmplies (mínim 40 ha) i tancades (totes les vinyes dins de la zona han de fer confusió).
- Es tracta d'una tècnica de lluita col·lectiva, si un sol viticultor no pot assolir el mínim de superfície, cal que es posi d'acord amb els veïns.
- S'aconsella col·locar els difusors uniformement dins la parcel·la, posant sempre el nombre de difusors per hectàrea que recomana la casa.
- El nombre de ceps a deixar entre difusor i difusor dependrà del marc de plantació de la vinya i caldrà calcular-ho prèviament.
- Les vores de la zona de confusió s'han de reforçar, doblant el nombre de difusors.
- És necessari tenir supervisió tècnica per verificar el seu funcionament, principalment durant els primers anys.
- Cal manipular els difusors amb guants ja que, tot i que no presenten toxicitat, poden ser irritants en contacte amb les mucoses.

Avellaner

Badoc

A les finques amb més d'un 15% de borrons afectats, es recomana realitzar un tractament a l'estadi de 3 a 6 fulles. Recordeu que cal mullar bé l'arbre i que aquest tractament ja no és efectiu a partir de l'estadi de 7 fulles.

Cigarrer

Ja s'ha iniciat l'eclosió dels ous. Només en aquelles finques amb més d'un 10% de postes viables és recomana realitzar un tractament dirigit a les larves nounades.

Bacteriosis

Només en aquelles finques on l'any passat es van detectar problemes importants d'aquesta malaltia es recomana protegir la brostada amb compostos cúprics. **Recordeu que en aquest cultiu no hi ha altres bactericides autoritzats.**

Barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*)

Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l'hivern per fer una lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les galeries actives sobre les quals es pot actuar mitjançant filferros o molles.

Ametller

Pugó

A mesura que quedin lliures de les despulles florals o collarí, i es vegi l'ametlló com l'ungha es recomana realitzar el seu control

Noguer

Bacteriosis

Els tractaments preventius amb productes cúprics són bàsics pel control d'aquesta malaltia. El primer s'ha de fer a obertura de borrons, esteu atents en les varietats primerenques.

Presseguer i nectarina

Varietats en floració: Monilia

En les zones afectades cal extremar la vigilància i protegir els arbres que estiguin en floració.

Varietats en post floració:

Trips:

Només cal protegir aquelles varietats sensibles de nectarina a caiguda de pètals

Pugó:

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les brostades

Horta:

All i fava

Rovell

Vigileu les plantacions i en cas necessari tracteu.

Enciam

Pugó

Vigileu les vostres plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes.

Ceba i calçot: Míldiu i *Stemphiliium* i Enciam: Míldiu

Humitats altes i temperatures suaus afavoreixen l'aparició d'aquestes malalties, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

Col, coliflor i bròquil

Erugues

Esteu atents a l'aparició de les primeres erugues

Parcs i jardins:

Palmeres

Morrut

S'ha detectat el vol dels primers adults. A partir d'aquest moment no es pot podar. Per mantenir protegides les palmeres es recomana realitzar els tractaments segons el protocol que podeu trobar a la web del Departament.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona
Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)
Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>
ssv.t.daam@gencat.cat