



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Serveis Territorials de Tarragona  
Sanitat Vegetal



## Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

**Avis del dia:** 1 de març de 2013



**Cultius:**

**Ametller, Presseguer i nectarina, Avellaner i noguer, Horta i Forestals,  
Parcs i jardins**

### Ametller

#### **Prefloració: arrufat i cribat**

A les finques on durant la campanya s'hagi produït una forta afectació d'arrufat o cribat, cal realitzar un tractament cúpric a mesura que les varietats comencin a inflar els borrons (estadi B) i mantenir la protecció fins a caiguda de pètals si les condicions són favorables.

#### **Floració: monilia**

A les zones on es produeixen atacs de la malaltia, es recomana realitzar un tractament a l'inici de la floració

#### **Post floració: pugó**

En les varietats primerenques, a mesura que quedin lliures de les despulles florals o collarí, i es vegi l'ametlló com l'ungla es recomana realitzar el seu control

### Presseguer i nectarina

#### **Prefloració:**

##### **Arrufat i cribat**

A mesura que les varietats comencin a inflar els borrons, cal fer un tractament amb fungicides cúprics per evitar aquestes malalties. Recordeu que en aquelles finques en les que ja es va fer el tractament però han tingut pluges abundants caldrà renovar la protecció.

##### **Pugó i poll de San Jose**

A les plantacions on les varietats es trobin amb botó rosa, es pot iniciar la protecció contra el pugó, i contra el poll de San Jose en les finques afectades.

**Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona**

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

## Avellaner i noguer

### **Barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*)**

Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l'hivern per fer una lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les galeries actives sobre les quals es pot actuar mitjançant filferros, molles o xeringues.

## Horta

### **CARXOFERA: Cuc de la carxofa (*Gorthyna xanthenes*)**

Continua l'eclosió dels ous, per tant, cal seguir controlant la població d'aquestes erugues abans de que penetrin als nervis de les fulles o a les tiges.

### **ENCIAM, COL I COL-I-FLOR: Pugó**

Vigileu les plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes.

### **API: Septoria**

Cal estar atents a l'aparició de taques a les plantacions i realitzar els tractaments oportuns.

### **PATATA**

És recomanable utilitzar patata de sembra certificada i sembrar els tubercles sencers sense trossejar-los, per evitar problemes fitosanitaris posteriors.

### **CEBA I CALÇOT**

#### **Míldiu**

Les condicions de pluja i humitat i temperatures suaus afavoreixen l'aparició d'aquesta malaltia, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

## Forestals, parcs i jardins

### **PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)**

Amb la baixada de temperatures hivernals, les captures d'insectes en les trapes de seguiment durant les últimes setmanes de desembre i gener, han estat nul·les.

Fins al més de febrer és el moment per realitzar treballs de poda i és una bona ocasió per vigilar si les palmeres estan afectades per la plaga.

Les palmeres mortes per la plaga i les que es considerin que no es poden salvar, així com les restes afectades provinents de sanejaments, cal destruir-les i portar-les als punts establerts per tal de gestionar-les adequadament.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: [www.gencat.cat/agricultura](http://www.gencat.cat/agricultura)