




Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Serveis Territorials de Tarragona
Sanitat Vegetal



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avis del dia: 8 de març de 2013



Cultius:
**Ametller, Presseguer i nectarina, Avellaner i noguer, Horta i Forestals,
Parcs i jardins**

Ametller

Prefloració: arrufat i cribat

A les finques on durant la campanya s'hagi produït una forta afectació d'arrufat o cribat, cal realitzar un tractament cúpric a mesura que les varietats comencin a inflar els borrons (estadi B) i mantenir la protecció fins a caiguda de pètals si les condicions són favorables.

Floració: monilia

A les zones on es produeixen atacs de la malaltia, es recomana realitzar un tractament a l'inici de la floració

Post floració: pugó

En les varietats primerenques, a mesura que quedin lliures de les despulles florals o collarí, i es vegi l'ametlló com l'ungla es recomana realitzar el seu control

Presseguer i nectarina

Prefloració:

Arrufat i cribat

A mesura que les varietats comencin a inflar els borrons, cal fer un tractament amb fungicides cúprics per evitar aquestes malalties. Recordeu que en aquelles finques en les que ja es va fer el tractament però han tingut pluges abundants caldrà renovar la protecció.

Pugó i poll de San Jose

A les plantacions on les varietats es trobin amb botó rosa, es pot iniciar la protecció contra el pugó, i contra el poll de San Jose en les finques afectades.

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

Avellaner i noguer

Barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*)

Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l'hivern per fer una lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les galeries actives sobre les quals es pot actuar mitjançant filferros, molles o xeringues.

Horta

CARXOFERA: Cuc de la carxofa (*Gorthyna xanthenes*)

Continua l'eclosió dels ous, per tant, cal seguir controlant la població d'aquestes erugues abans de que penetrin als nervis de les fulles o a les tiges.

ENCIAM, COL I COL-I-FLOR: Pugó

Vigileu les plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes.

API: Septoria

Cal estar atents a l'aparició de taques a les plantacions i realitzar els tractaments oportuns.

PATATA

És recomanable utilitzar patata de sembra certificada i sembrar els tubercles sencers sense trossejar-los, per evitar problemes fitosanitaris posteriors.

CEBA I CALÇOT

Míldiu

Les condicions de pluja i humitat i temperatures suaus afavoreixen l'aparició d'aquesta malaltia, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

Forestals, parcs i jardins

PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Amb la baixada de temperatures hivernals, les captures d'insectes en les trames de seguiment durant les últimes setmanes de desembre i gener, han estat nul·les.

Fins al més de febrer és el moment per realitzar treballs de poda i és una bona ocasió per vigilar si les palmeres estan afectades per la plaga.

Les palmeres mortes per la plaga i les que es considerin que no es poden salvar, així com les restes afectades provinents de sanejaments, cal destruir-les i portar-les als punts establerts per tal de gestionar-les adequadament.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: www.gencat.cat/agricultura