



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 13 de març de 2015
Avís 07/2015

Cultius:

Avellaner i noguer, ametller, presseguer i nectarina, horta i parcs i jardins

Avellaner i noguer

Barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*)

Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l'hivern per fer una lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les galeries actives sobre les quals es pot actuar mitjançant filferros o molles.

Ametller

Varietats en prefloració: Arrufat i cribat

A les finques on durant la campanya anterior s'hagi produït una forta afectació d'arrufat o cribat cal realitzar la protecció des de l'estadi B (borró inflat) fins a caiguda de pètals.

Varietats en inici de floració: Monilia

A les finques on tradicionalment es produeixen atacs de la malaltia, es recomana realitzar un tractament a inici de floració.

Varietats en postfloració: Pugó

A mesura que quedin lliures de les despulles florals o collarí, i es vegi l'ametlló com l'ungla es recomana realitzar el seu control

Presseguer i nectarina

Varietats en prefloració: Pugó i poll San Jose, arrufat i cribat

A les varietats que es trobin en botó rosa, es pot iniciar la protecció contra el pugó. En les finques afectades per poll de San Jose, també és el moment de fer el control. Sinó s'ha realitzat el tractament preventiu contra arrufat i cribat, es pot afegir un fungicida orgànic.

Nota: Cal assegurar-se que els productes utilitzats estan autoritzats en prefloració, ja que recordem que s'han produït modificacions en les autoritzacions d'algunes matèries actives.

Varietats en inici de floració: Monilia

En les zones afectades cal extremar la vigilància i protegir els arbres que estiguin a inici de floració.

Horta:

Patata

És recomana utilitzar patata de sembra certificada i sembrar els tubercles sencers sense trossejar-los, per evitar problemes fitosanitaris posteriors.

Carxofa

Cuc de la carxofa (*Gorthina xanthenes*)

Cal seguir controlant les larves d'aquest barrinador, per tal d'evitar que penetrin a l'interior de les fulles, ja que, una vegada a dins, els tractaments no són eficaços.

Enciam

Pugó

Vigileu les vostres plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes.

Ceba i calçot: Míldiu i *Stemphilium* i Enciam: Míldiu

Humitats altes i temperatures suaus afavoreixen l'aparició d'aquestes malalties, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

Parcs i jardins:

Palmeres

Morrut

Per tenir protegides las palmeres es recomana començar a realitzar el tractaments segons el protocol que podeu trobar a la web del Departament.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona
Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>
ssv.t.daam@gencat.cat