



Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Serveis Territorials de Tarragona
Sanitat Vegetal



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 9 de novembre de 2012



Cultius:

Olivera, Fruita seca i fruiters, Cítrics i Horta

Olivera

Mosca de l'olivera: *Bractocera oleae*

Donat que els atacs de mosca són molt irregulars, per part dels pagesos cal seguir fent recomptes de picada i tractar si es supera l'índex del 5% d'olives picades. Especialment cal estar atents a la zones endèmiques del Baix Penedès, Tarragonès i Baix Camp i realitzar un tractament si es preveu una recol·lecció tardana.

Recordeu que cal tenir en compte els terminis de seguretat dels productes fitosanitaris a aplicar, que són els dies que han de passar entre el tractament i la recol·lecció.

En agricultura ecològica després de les pluges, si es preveu una recol·lecció tardana, és el moment tornar a protegir amb el caolí com a repel·lent o amb l'espinosad esquer com adulticida.

Fruita seca i fruiters

Tractament a caiguda de fulla

És recomanable realitzar un tractament a caiguda de fulla amb compostos cúprics i fungicides orgànics per evitar l'entrada de fongs i bacteris causants de malalties, especialment si es donen condicions de pluges.

Cítrics:

AIGUALIMENT DELS FRUITS (*Phytophthora sp.*)

Cal realitzar un tractament si es produeixen pluges o humitats ambientals contínues.

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

ENCIAM, ESCAROLA, COLS I COL-I-FLOR

Erugues

Esteu atents a l'aparició d'erugues per al seu control.

CEBA i CALÇOT

Stemphiliium

Les condicions climàtiques actuals, afavoreixen l'aparició d'aquesta malaltia, per la qual cosa, cal estar atents i prendre mesures adequades per mantenir els cultius protegits

TOMÀQUET

Tuta absoluta

Cal seguir realitzant controls individualitzats ja que les poblacions i els danys varien molt segons les condicions de cada parcel·la.

FORESTALS

Processionària del pi

En el cas de detectar la presència de la plaga cal fer el tractament el més ràpid possible. A mesura que les erugues siguin més grans i les bosses més visibles els danys s'incrementaran i l'eficàcia del tractament anirà disminuint.

*PAE: Productes autoritzats en Producció Agrària Ecològica