




Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Serveis Territorials de Tarragona
Sanitat Vegetal



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 21 d'octubre de 2013



Cultius:
Olivera, Cítrics, Horta, Forestal, Parcs i jardins

Olivera

Mosca de l'olivera. *Bactrocera oleae*

A les Comarques de Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp, Priorat i Conca de Barberà ja es va donar l'avís.

Donat que actualment les temperatures es mantenen elvades per aquesta època de l'any i els atacs de mosca són molt irregulars, per part dels pagesos cal seguir fent recomptes de picada i tractar si es supera l'índex del 5% d'olives picades. Especialment cal estar atents a la zones endèmiques del Baix Penedès, Tarragonès i Baix Camp i realitzar un tractament si es preveu una recol·lecció tardana.

Recordeu que cal tenir en compte els terminis de seguretat dels productes fitosanitaris a aplicar, que són els dies que han de passar entre el tractament i la recol·lecció.

Recordem que en agricultura ecològica cal mantenir protegit el cultiu.

Cítrics:

Mosca de la fruita: *Ceratitis*

Aquest any les poblacions són molt elevades, cal protegir els fruits durant el període de maduració .

Horta

HORTA EN GENERAL

Erugues

Esteu atents ja que les poblacions estan augmentant molt per les bones temperatures actuals.

TOMÀQUET

Tuta absoluta

Estigueu molt atents, ja que amb les temperatures actuals les poblacions de *Tuta* es poden mantenir elevades. Cal seguir realitzant controls individualitzats a cada finca ja que les poblacions i els danys varien molt segons les condicions de cada parcel·la.

Cuc del tomàquet o *Heliothis*

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

Alternaria

Els tractaments a base de coure ajuden a reduir la propagació del fong.

Cendrosa

Vigileu l'aparició d'aquesta malaltia que es presenta en forma de taques grogues a les fulles.

Forestals

Processionària del pi

En el cas de detectar la presència de la plaga cal fer el tractament el més ràpid possible. A mesura que les erugues siguin més grans i les bosses més visibles els danys s'incrementaran i l'eficàcia dels tractaments anirà disminuint.

Parcs i jardins

PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Entre l'inici de primavera i final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut. Cal seguir les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta en funció del tipus d'insecticida utilitzat.

La poda de palmeres s'ha de realitzar entre els mesos de desembre del 2013 i febrer del 2014.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: www.gencat.cat/agricultura

Links d'interés:

[Informació i video sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris:](#)